

クミアイ 水稻育苗箱用殺虫剤
ワンリード® 箱粒剤08

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標

初期害虫を
確実にたたく
「ワンリード」。



イネミズゾウムシ



イネドロオイムシ



セジロウシカ

は種前から移植当日まで、
いつ使っても効果的。

適用拡大
高密度は種に
対応



特 長

- 1 は種前から、移植当日まで、いつ使っても効果的**
は種前(床土混和)・は種時覆土前から移植当日まで処理時期の幅が広く利便性に優れ、卓効を示します。
- 2 イネミズゾウムシ、イネドロオイムシに優れた防除効果を発揮**
低濃度で高い活性を示し、長期間にわたって効果が持続します。
- 3 優れた浸透移行性**
処理された粒剤の有効成分は、稲体内に吸収され的確に効果を発揮します。

適用害虫および使用方法


2022年10月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本 剤 の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む 農 業 の 総 使 用 回 数
稲 (箱育苗)	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ	育苗箱(※) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土に 均一に混和する	4回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計3回以内)
		高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(※) 1箱当り50～100g)				
		育苗箱(※) 1箱当り50g	は種時覆土前 ～移植当日		育苗箱の上から 均一に散布する	
		高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(※) 1箱当り50～100g)				


※30×60×3cm、使用土壌約5ℓ

試験成績


■ イネミズゾウムシに対する効果



■ イネドロオイムシに対する効果



■ セジロウンカに対する効果



⚠️<使用上の注意事項(抜粋)> 詳細はラベルをご参照ください。

- (1)育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植してください。
- (2)育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当りに乾粒として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- (3)軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- (4)本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはいねいに行い、移植後田面が露出しないように注意してください。
- (5)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意してください。特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6)本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。