

水稲用 初・中期一発処理除草剤

ラオウ®

ジャンボ

水田除草の 勝者と 成る。

ノビエ

ホタルイ

オモダカ



エフィーダ®
(莖葉白化作用)



フェノキサスルホン®
(ノビエ残効性)



ベンスルフロンメチル
(幅広い草種に対応)



Dymron
ダイムロン
(カヤツリグサ科の発芽抑制)

4成分で除草を制す。



- 有効成分：ダイムロン……………24.0%
 フェノキサスルホン……………6.0%
 フェンキノトリオン……………10.0%
 ベンスルフロンメチル……………3.0%
- 人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

特長

- 有効成分「エフィーダ®(一般名：フェンキノトリオン)」を配合した4成分の混合剤です。
- エフィーダ配合により水稲安全性が高く、広葉雑草に幅広く効果を示し、特にホタルイなどのカヤツリグサ科雑草に高い効果を発揮します。
- ベンスルフロンメチル配合により多年生難防除雑草に高い効果を示します。
- フェノキサスルホン配合によりノビエに優れた除草効果と長期残効性を示します。

適用雑草及び使用方法

2021年12月22日現在の登録内容

※各有効成分を含む農薬の総使用回数：ダイムロン3回以内(移植水稲：育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)・2回以内(直播水稲)、フェノキサスルホン2回以内、フェンキノトリオン2回以内、ベンスルフロンメチル2回以内

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草及びマツバイ ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ、オモダカ クログワイ、コウキヤガラ	移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装(パック) 10個(250g)	1回※	水田に 小包装(パック) のまま投げ入れる。
直播水稲	一年生雑草及びホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			



△ 使用上の注意

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイ、ウリカワは2葉期まで、ミズガヤツリは草丈10cmまで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期までが本剤の散布適期です。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のもめでは十分な効果を示さないで、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 苗の植付けが均一となるように、代かき及び植付作業はていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 散布の際は、やや深めの湛水状態(水深5~6cm)にして水の出入りを止めてください。
- 散布後少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、入水は静かに行ってください。
- 小包装(パック)のまま10アール当り10個の割合で水田に均一に投げ入れてください。
- 藻類・表層はく離、浮き草などの水面浮遊物が多い場合は、拡散が不十分になるおそれがあるため、使用はさけてください。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるため使用をさけてください。

- 異常高温の時、あるいは散布後数日以内に梅雨明けになるなど異常高温が予想される時
- 活層遅延を生じるような異常低温の時
- 砂質土壌の水田および漏水田(減水深2cm/日以上)
- 軟弱苗を移植した水田
- 極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田
- 植穴の戻りの悪い水田
- 直播水稲に使用する場合、以下の点に注意してください。
- 稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、入水後水持ちの安定した後に散布してください。
- 梅雨時期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下するおそれがあるので使用をさけてください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意してください。
- 散布した水田の田面水を他の作物の灌水に使用しないでください。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分に注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考に使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

△ 安全使用上の注意

- 水溶性フィルムで小包装化されているため、濡れた手で触らないでください。
 - 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
 - 眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
 - 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、阴凉乾燥した場所に保管してください。製剤は吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管してください。

詳しい使い方、登録内容は
こちらから。

ジャンボ



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌を記載しましょう。

本資料は2021年12月22日現在の知見に基づき作成しています。 2158(22-12)