

自然に学び 自然を守る



育苗箱専用殺虫剤

クミアイ

パディート[®] 箱粒剤

powered by

CYAZYPYR[®]
ACTIVE INGREDIENT



1 kg



10 kg



確実な初期の防除は、
やがて育む未来のために。

©2022 FMC Corporation All rights reserved.

CYAZYPYR[®]、パディート[®]は、FMC Corporation またはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

作用性


有効成分サイアジピル®は昆虫の筋肉細胞に作用し、速やかに筋肉を収縮させ、死に至らしめます。

特長

- アントラニリックジアミド系の殺虫成分です。
- 初期害虫(イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ)、チョウ目、イナゴ類など、幅広い害虫に高い効果(クロススペクトラム)を示します。
- 根から速やかに取り込まれ、稲体全体に速やかに浸透移行します。主に経口的に作用し、速やかに食害・吸汁害を停止させます。
- 水稲に対して高い安全性を示します。
- 他剤に対し抵抗性を発達させた害虫に対して高い効果を示します。
- は種時処理により長期間にわたり効果が持続し、省力化に貢献します。


試験成績

イネヒメハモグリバエ




平成23年 宮城県植物防疫協会
 品 種：ひとめぼれ
 移植日：5月6日
 処理日：5月6日
 発生状況：少発生(無処理：幼虫数16頭 / 300株、
 蛹数58頭 / 300株)
 調査日：移植21日後
 調査法：各区3地点、1地点あたり100株、計300株について葉内の幼虫・蛹数を調査した。

フタオビコヤガ



平成23年 鳥取県農林総合研究所農業試験場
 品 種：きぬむすめ
 移植日：5月25日
 処理日：パディート箱粒剤：5月6日(は種時)
 B剤：5月25日(移植当日)
 発生状況：少→中発生
 調査日：移植30日後、47日後、63日後
 調査法：各区3地点、1地点あたり200株、計600株について払い落としにより幼虫数を調査した。

イネドロオイムシ



平成22年 地方独立行政法人
 北海道立総合研究機構 上川農業試験場
 品 種：ほしのゆめ
 移植日：5月26日
 処理日：パディート箱粒剤：5月23日(移植3日前)
 C剤：5月26日(移植当日)
 発生状況：中発生
 無処理25株あたりの被害葉数519枚
 調査日：移植26日後、41日後
 調査法：各区25株について被害葉数を調査し、被害率を求め防除価を算出した。

適用害虫と使用方法

2022年4月20日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イナゴ類 イネヒメハモグリバエ	高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50~100g)	移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に散布する	1回
		育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50g				
	ヒメトビウンカ	高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50~100g)	移植3日前 ~移植当日			
		育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50g				
イネミズゾウムシ イネドロオイムシ コブノメイガ ニカメイチュウ フタオビコヤガ ツマグロヨコバイ イネツトムシ	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50g	は種時 (覆土前) ~移植当日				
	高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50~100g)					
	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50g	は種前				

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤を床土または覆土に混和する場合、処理後速やかに使用してください。また、本剤を処理した床土または覆土を放置しないでください。
- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当りに乾物として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 育苗箱の上から均一に散布し、軽く灌水してから移植してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ヒメトビウンカに対しては残効性に注意してください。

安全使用上の注意

- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。
- 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、涼涼・乾燥した場所に保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。● 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。● 防除日誌を記帳しましょう。

2127(22-7)

販売



クミアイ化学工業株式会社

本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL.03-3822-5036
 ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>

製品情報は
 こちらから▶

