

各位

全3ページ
登録速報(2023-072)
2023年 2月14日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り新規登録となりましたので、ご連絡します。
新規登録年月日：2023年2月14日

記

1 農薬の種類及び名称

種類：フルキサメタミド水和剤

名称：グレーシアフロアブル（日産化学(株)登録）

登録番号：第24743号

2 農薬の物理的・化学的性状

類白色水和性粘稠懸濁液体

3 農薬の有効成分の種類及び含有濃度

4-[(5*RS*) -5-(3,5-ジクロロフェニル)-4,5-ジヒドロ-

5-(トリフルオロメチル)-1,2-オキサゾール-3-イル]-*N*-

[(*EZ*)-(メトキシイミノ)メチル]-*o*-トルアミド

10.0%

4 農薬のその他の成分の種類及び含有濃度（15に掲げる事項を除く。）

水、界面活性剤 等

90.0%

5 農薬の適用病害虫の範囲、使用方法及び使用期限

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルキサマト [®] を含む農薬の総使用回数	
かんきつ	アザミウマ類 ゴマダラカミキリ成虫 カネタキ ケムシ類 チャノホリタニ ミカンサビダニ	4000 倍	200~700 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内	
	ぶどう			ハスモンヨトウ チャノキイロアザミウマ				収穫 14 日前 まで
	もも類			ハマキムシ類				
	小粒核果類			ケムシ類				

使用期限：3 年

6 農薬の使用上の注意事項（8に掲げる事項を除く。）

- (1) 使用前によく振ってから使用する。
- (2) 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ、調節すること。
- (3) 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布すること。
- (4) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (5) 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

7 人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法

(1) 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

該当なし

(2) 使用に際して講ずべき被害防止方法

該当なし

8 生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

9 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法ではその該当がない。

10 農薬の貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。

以上