

ロイアント™ 乳剤

Rinskor™ active

水稲用除草剤

農林水産省登録：第24387号

水田畦畔の雑草防除

水田畦畔に適用拡大！ 田んぼの中も畦畔も。

- 稲への飛散薬害の心配なく畦畔の広葉雑草を防除できます。
- 水田内と同時に畦畔の除草ができます。



■各種雑草効果確認事例



タカサブロウ(20cm)



ヒメジョオン(70cm)



ヒメムカシヨモギ(65cm)




オオアレチノギク(25cm)



カラスノエンドウ(29cm)



ツククサ(28cm)



エノキグサ(8cm)



アメリカフウロ(14cm)



イヌタデ(18cm)



ヤムグラ(39cm)




ヨモギ(30cm)



アレチナスビトハギ(32cm)



クズ(40cm)



スギナ(33cm)



ヤブガラシ(95cm)

■適用雑草と使用方法

2023年3月現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アールあたり 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	フロルピラウキシフェン ベンジルを含む総使用回数
移植水稲	—	一年生広葉雑草及び ノビエ、マツバイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ	移植後20日～ ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで	薬量：200ml 希釈水量：25～100ℓ	2回以内	落水散布、 ごく浅く湛水して 散布又は湛水散布	3回以内
		アゼガヤ、オモダカ、 エゾノサヤヌカグサ、シズイ、 ナガエツルノゲイトウ				乾田・落水状態で 雑草茎葉散布 又は全面散布	
直播水稲	—	一年生広葉雑草及び ノビエ、ミズガヤツリ、 ウリカワ、セリ	稲3葉期～ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで	薬量：200ml 希釈水量：100ℓ	—	雑草茎葉散布	2回以内
水稲 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生及び 多年生広葉雑草	収穫45日前まで (雑草生育期)	薬量：200ml 希釈水量：25～100ℓ	—	—	—

- 畦畔のイネ科雑草には効果が期待できません。
- 土壌水分が少ないと効果が十分に発揮されない場合があります。

ロイアント乳剤についてもっと詳しくはこちら→



全農 登録商標 第4702318号

自然に学び 自然を守る
クミアイ化学工業株式会社
 本社：〒110-8782 東京都台東区池之端1-4-26 TEL.03-3822-5036
 ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>