

自然に学び自然を守る



IBR剤 (Insect Behavior Regulator) 昆虫行動制御剤

農林水産省登録
第22798号

クミアイ

コルト®

殺虫剤

顆粒水和剤

害虫防除の馬カアツプ!




マダラカサハラハムシ
に適用拡大!

残留基準値 (単位:ppm)

日本	台湾	米国
20	15	20

2023年6月時点



お茶の様々な害虫に。



チャノキイロアザミウマ



チャノミドリヒメヨコバイ



クワシロカイガラムシ



チャトゲコナジラミ



アブラムシ類

天敵にやさしい



クワシロカイガラムシの天敵
チビトビコバチ

1 新しいタイプの殺虫剤
昆虫の行動を制御（吸汁・歩行・飛翔・定着を阻害）するこれまでにないタイプ（IBR）の殺虫剤です。

2 アブラムシ・コナジラミ・カイガラムシ・チャノキイロアザミウマ防除に効果的




3 天敵に優しい

適用病害虫および使用方法（抜粋） が2023年2月に適用拡大になりました。 <2023年6月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数
茶	クワシロカイガラムシ	2000~3000倍	1000ℓ/10a	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャトゲコナジラミ アブラムシ類		200~400ℓ/10a				
	ツマグロアオカスミカメ マダラカサハラハムシ	2000倍					

<詳しくは製品ラベルをご確認ください>

試験成績



注意事項

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性の強い薬剤との混用はさけてください。
- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチやその巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 使用中に身体に異常を感じた場合には医師の手当を受け、また、誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。 ●防除日誌を記帳しましょう。