



※移植のみ

農林水産省登録 第24568号

水稲用 初・中期一発処理除草剤

# アカツキ®

ジャンボ

# 米づくりにも、 希望の 光。

ノビエ

クログワイ

オモダカ

アルテア配合  
アルテア  
(塊茎形成抑制作用)

エフィーダ®  
(莖葉白化作用)

フェノキサスルホン®  
(ノビエ残効性)

3つの高い除草効果



※商品画像はイメージです。®はクミアイ化学工業(株)の登録商標  
アルテアは日産化学(株)の登録商標

## 特長


- 有効成分「エフィーダ®(一般名：フェキノトリオン)」を配合した3成分の混合剤です。
- エフィーダの作用によりコナギやミズアオイなどの広葉雑草、ホタルイなどのカヤツリグサ科雑草にも高い効果を示します。
- アルテアを配合することにより、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイなど難防除多年生雑草に高い効果を示し、地上部だけでなく地下部も抑制します。
- フェノキサスルホンを配合することによりノビエに優れた除草効果と長期残効性を示します。

## 適用雑草及び使用方法

2023年9月現在の登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草及び多年生広葉雑草	移植後3日～ノビエ3葉期 但し、収穫60日前まで	小包装(パック) 10個 (250g)	1回※	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。
直播水稲	一年生雑草及び ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ3葉期 但し、収穫60日前まで			

※各有効成分を含む農薬の総使用回数：フェノキサスルホン2回以内、フェキノトリオン2回以内、メタゾスルフロン2回以内



### ⚠ 使用上の注意

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイ、ヘラオモダカは3葉期まで、ウリカワは2葉期まで、オモダカは矢尻葉1葉期まで、ミズガヤツリ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは草丈10cmまでヒルムシロは発生期まで、セリは再生期までが本剤の散布適期です。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のもものでは十分な効果を示さないため、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 苗の植付けが均一となるように、代かき及び植付作業はていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 散布の際は、やや深めの湛水状態(水深5～6cm)にして水の出入りを止めてください。
- 散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(水深3～5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、入水は静かに行ってください。
- 小包装(パック)のまま10アール当り10個の割合で水田に均一に投げ入れてください。
- 藻類・表層はく離、浮き草などの水面浮遊物が多い場合は、拡散が不十分になるおそれがあるため、使用は避けてください。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるため使用を

- さけてください。
- 異常高温の時、あるいは散布後数日以内に梅雨明けになるなど異常高温が予想される時
- 活着遅延を生じようとする異常低温の時
- 砂質土壌の水田および漏水水田(減水深2cm/日以上)
- 軟弱苗を移植した水田
- 極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田
- 種穴の戻りの悪い水田
- 直播水稲に使用する場合は以下の点に注意してください。
- 稲の根が露出した条件では薬害を生じおそれがあるので使用をさけてください。
- 除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、入水後水持ちの安定した後に散布してください。
- 梅雨時期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下するおそれがあるので使用をさけてください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意してください。
- 散布した水田の田面水を他の作物の灌水に使用しないでください。
- 本剤はその殺草特性から、いくさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分に注意してください。
- いくさ栽培予定水田では本剤を使用しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよ

うに注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

### ⚠ 安全使用上の注意

- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
  - 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
  - 眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
  - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
  - 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 保管：密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷凍乾燥した場所に保管してください。製剤は吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管してください。

詳しい使い方、登録内容とSDSはこちらから。

ジャンボ

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌を記載しましょう。

本資料は2023年9月現在の知見に基づき作成しています。 2301(23-9)