

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 24941 号

登 録 年 月 日 令和 7 年 1 月 15 日

農 薬 の 種 類 オキサゾスルフィル・インピルフルキサム・ジクロベンチアゾクス粒剤

農 薬 の 名 称 ブーンアレスモンガレス箱粒剤

農 薬 の 物 理 的 類白色～淡褐色細粒
化 学 的 性 状

農薬の有効成分の
種類及び含有濃度 2-[3-(エチルスルホニル)-2-ピリジル]-5-(トリフルオロメチルスルホニル)-1,3-ベンゾオキサゾール 2.0%
3-(シフルオロメチル)-N-
[(R)-2,3-ジヒドロ-1,1,3-トリメチル-1H-インダゾル-4-イル]-1-メチルピラゾール-4-カルボキサミド 2.0%
3-(3,4-ジクロロ-1,2-チアゾール-5-イル)メトキシ-1,2-ベンゾチアゾール=1,1-ジオキシド 2.0%

農 薬 の そ の 他 の 鉍物質微粉等 94.0%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 濃 度

農薬の適用病害虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

農 薬 の 使 用 期 限 5年6箇月

農 薬 の 使 用 に (別記2のとおり)
際して講ずべき
被 害 防 止 方 法

農薬の製造者又は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

農 薬 の 製 造 場 の 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業㈱小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業㈱龍野工場

農薬原体の有効成分 (別記3のとおり)
以外成分の
種 類 及 び 含 有 濃 度

農薬取締法第3条第9項の規定に基づき上記のとおり登録した。

令和 7 年 1 月 15 日

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用病害虫 名	使用量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ネキサスRフロ を含む農薬 の総使用回 数	インビRフロキ を含む農薬 の総使用回 数	ジクベンチア ゾックスを含む 農薬の総使 用回数
稲(箱育苗)	いもち病、紋枯病、ウカ類、 ツマク、ロヨコバ、イ、イヌ、ソ、ウシ、 イ、ロイシ、コ、ノメイカ、フタ ヒ、ツカ、ニ、カ、イ、ウ、イ、トシ、 イ、コ、類	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5Q)1箱当 り50g	は種時(覆土 前)～移植当 日	1回	育苗箱の上か ら均一に散布 する。	1回	1回	3回以内(移植時ま での処理は1回以 内、本田での散布 は2回以内)
		高密度には種する場合 は1kg/10a(育苗箱(30 ×60×3cm、使用土壌約 5Q)1箱当り50～100g)						
	白葉枯病、もみ枯細菌病、 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5Q)1箱当 り50g	移植当日					
		高密度には種する場合 は1kg/10a(育苗箱(30 ×60×3cm、使用土壌約 5Q)1箱当り50～100g)						

(別記2)

1. 使用者への被害防止方法

(1) 防護装備

該当なし

(2) その他の被害防止方法

該当なし

2. 蜜蜂への被害防止方法

該当なし

(別記3)

オキサリフルン原体

有効成分以外の成分の総量

40g/kg以下

(オキサリフルン

960g/kg以上)

インピルルキサム原体

有効成分以外の成分の総量

50g/kg以下

(インピルルキサム

950g/kg以上)

ジカベンチゾクス原体

有効成分以外の成分の総量

40g/kg以下

(ジカベンチゾクス

960g/kg以上)