

総合殺菌剤

低コスト農業の強い味方。

30



Anniversary

th



多くの作物の病害に
優れた防除効果

クミアイ

ペンコゼゴ®

水和剤



クミアイ

マンゼブ

水和剤

殺菌剤分類 M3

一般名：マンゼブ (mancozeb: ISO名)
有効成分：マンゼブ・・・・・・80.0%
人畜毒性：普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

1 多くの作物の
広範囲の病害に

病原菌の孢子発芽や菌糸生育を強く阻害することにより、広範囲の病害に優れた防除効果が期待できます。

2 予防効果に優れ、
安定した効果

付着性、耐雨性に優れ、散布された有効成分が植物の表面を長く保護するので、安定した予防効果が期待できます。

3 適用作物への
薬害も少ない

適用作物への影響は少なく、薬害の心配はほとんどありません。

適用作物・病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用量(ℓ)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	
みかん	黒点病	400～800	200～700	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内	
	小黒点病	600～800						
	そうか病	400						
	チャノキイロアザミウマ、そばかす病、褐色腐敗病	400～600						
	ミカンサビダニ	1,000						
かんきつ (みかんを除く)	炭疽病	600		収穫90日前まで	2回以内		2回以内	
	チャノキイロアザミウマ、炭疽病、褐色腐敗病、そばかす病、汚れ果症	600～800						
	黒点病、小黒点病	1,000						
かき	炭疽病、落葉病	400～800		収穫45日前まで	2回以内		2回以内	
	うどんこ病	400						
なし	黒星病、赤星病	400～600		収穫30日前まで	5回以内		5回以内	
	黒斑病、輪紋病	600						
りんご	黒星病、赤星病、黒点病、斑点落葉病、褐斑病、炭疽病、すす点病、すす斑病	500～600		収穫21日前まで	3回以内		3回以内	
	輪紋病	500						
もも	黒星病、果実赤点病、せん孔細菌病	600		収穫45日前まで	2回以内		2回以内	
おうとう	灰星病	1,000						
ぶどう	黒とう病、べと病、晩腐病、褐斑病、さび病	1,000						
オリーブ	炭疽病	600						
びわ	たてぼや病	800	収穫45日前まで	7回以内	7回以内			
マンゴー	炭疽病	400～600						
すいか	炭疽病、つる枯病	600				収穫7日前まで	5回以内	5回以内
	褐色腐敗病	400～600						
メロン	つる枯病、べと病	600	収穫前日まで	3回以内	3回以内			
	炭疽病、褐斑病、黒星病	600～800						
きゅうり	べと病	400～600	収穫30日前まで	1回	1回			
キャベツ	べと病、黒斑病、白斑病	600						
はくさい	黒葉枯病	400～600	収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
にんじん	べと病、黒斑病、さび病	400						
ねぎ	べと病、黒斑病、灰色かび病	400～600	収穫3日前まで	5回以内	5回以内			
たまねぎ	軟腐病	400						
ばれいしょ	夏疫病、疫病	400～600	収穫7日前まで	10回以内	10回以内 (無人航空機散布は3回以内)			
	疫病	100						
さといも		500	2回以内	2回以内	2回以内			
		400～600						
てんさい	褐斑病	125	25	収穫21日前まで	5回以内	5回以内		
		400						
だいず	べと病	400～600	100～300	収穫45日前まで	3回以内	3回以内		
	紫斑病							
にんにく	葉枯病		200～700	最終収穫後から落葉期まで	5回以内	5回以内		
さんしょう(果実)	さび病							
いちご	炭疽病	600	100～300	収穫76日前まで	3回以内	3回以内		
アスパラガス (露地栽培)	炭疽病							
かぼちゃ	葉枯病	500	100～300	収穫終了後但し、秋期まで	6回以内	6回以内		
	斑点病、茎枯病	600						
やまのいも	べと病、疫病	600	収穫21日前まで	2回以内	2回以内			
トマト	炭疽病、葉渋病	400～600						
樹木類	疫病、葉かび病	800	200～700	収穫前日まで	2回以内	2回以内		
	炭疽病、斑点症(シュドサーコスボラ菌)	600						
	枝枯細菌病			発病初期	4回以内	4回以内		
				新梢伸長期～発病初期				

【使用上の注意事項：抜粋】各作物に関する注意事項はラベルをご確認ください。

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- ボルドー液との7日以内の近接散布は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 極端な高温多湿条件下では、軟弱幼苗に薬害の出るおそれがあるので注意してください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。



- かぶれやすい人は作業に従事しないようにし、施用した作物との接触はさけてください。
- 夏期高温時の使用はさけてください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵・乾燥した場所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌に記帳しましょう。

本資料は2025年5月現在の知見に基づき作成しております。 2494(25-5)



詳しい使い方、
登録内容とSDSは
こちらから