


すぐ効く、よく効く、ながく効く



水稲のウンカ・ヨコバイ類を始め、ドロオイ、カメムシ、イナゴなど主要害虫に速効的で強力な効果。さらにだいず、えだまめ、あずき、とうもろこし、かんしょ、キャベツ、小麦、やまのいも、きゅうり、すいか、なす、はくさい、だいこん、ばれいしょ、さといも、わんこん、トマト、オクラに登録があります。

クミアイ 農業用殺虫剤



トレボン® 粉剤DL

有効成分：エトフェンブロックス……0.50%

トレボンは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標です。



ツマグロヨコバイ



トビイロウンカ



セジロウンカ



ヒメトビウンカ



イネドロオイムシ



イネミズアムシ



イナゴ類



カメムシ類



ウリハムシ



アオムシ

人畜毒性：普通物*

*「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、
特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

詳しい使い方、
登録内容とSDSは
こちらから



■適用害虫および使用方法

(2023年5月現在の登録内容)

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量 (kg/10a)	使用時期	本剤およびエトフェン ブロックスを含む 農薬の総使用回数	使用 方法	
稲	－	イネツトムシ	4	収穫7日前まで	3回以内	散布	
		カメムシ類 イネミズゾウムシ成虫 ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ アザミウマ類 イナゴ類 イネドロオウムシ ニカメイチュウ	3～4				
		イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ	3				
水田作物 畑作物 (休耕田)	※	カメムシ類	3～4	－			
小麦	－	ヒメトビウンカ アブラムシ類	4	収穫14日前まで	2回以内		
すいか		ハスモンヨトウ ウリハムシ		収穫3日前まで	3回以内		
かぼちゃ		コナジラミ類		収穫前日まで			
きゅうり		アブラムシ類 ウリハムシ					3～4
なす		テントウムシダマシ類	4				収穫7日前まで
トマト		コナジラミ類			3回以内		
オクラ		アブラムシ類					
はくさい		コナガ					
だいこん		アオムシ	3～4	収穫21日前まで			
		ダイコンハムシ					
豆類 (種実)	－	ハスモンヨトウ マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 アズキノメイガ	4	収穫14日前まで	2回以内		
えだまめ		ハスモンヨトウ	3～4		収穫7日前まで	3回以内	
		マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ	4				
		マメコガネ					
		やまのいも		シロイチモジヨトウ			
さといも		ハスモンヨトウ		4	収穫7日前まで	4回以内	
かんしょ		ナカジロシタバ					
ばれいしょ		テントウムシダマシ類					
とうもろこし							
飼料用とうもろこし (子実)			アワノメイガ				
キャベツ		ハスモンヨトウ アブラムシ類 アオムシ	3～4	収穫3日前まで	3回以内		

※ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

特長

- ① 水稻のウンカ類・ヨコバイ類に優れた効果
- ② 優れた速効性と残効性
- ③ 抵抗性害虫にも有効
- ④ 幅広い作物の害虫にも有効



使用上の注意事項



① 水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、
河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して
使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてくだ
さい。



② 散布後は水管理に注意してください。



③ 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでくだ
さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えな
いよう適切に処理してください。



④ 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉
剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、
散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布して
ください。



⑤ イネミズゾウムシ成虫に使用する場合、移動範囲が広い
のなるべく広域でいっせいに防除し、畦畔などの周辺
雑草にも散布してください。



⑥ 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤
らないよう注意してください。とくに適用作物群に属す
る作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、
使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認し
てから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機
関の指導を受けることをおすすめします。



⑦ 誤食などのないよう注意してください。



⑧ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよ
うに注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗
してください。



⑨ 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の
作業衣などを着用してください。



⑩ 作業後は手足、顔等を石けんでよく洗い、洗眼・うがいを
してください。



⑪ 蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園が
ある場合には絶対に桑葉にかからないようにして
ください。



⑫ 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。



⑬ ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意して
ください。

● ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがあ
る場合には使用しないでください。

● 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体
等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、
養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係
る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封
して保管してください。

万一、誤食・誤飲した場合には、速やかに医師の手当を
受けてください。皮膚などにかかった場合には、十分な
水で洗い流してください。さらに、異常を感じた場合は、
医師の手当を受けてください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
○容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ○防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2023年5月現在の知見に基づき作成しています。2524(25-6)

自然に学び 自然を守る



クミアイ化学工業株式会社

本社:東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL03-3822-5036
ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>



JAグループ

農

協

全

農

経済連

全農は登録商標 第4702318号