

# 農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 18606 号

登 録 年 月 日 平成29年 12月 27日

農 薬 の 種 類 ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン乳剤

農 薬 の 名 称 クリアターン乳剤

物 理 的 黄赤色澄明可乳化油状液体  
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルカーバメート ..... 50.0%  
種 類 及 び 含 有 量 N-(1-エチルプロピル)-3,4-ジメチル-2,6-ジトリロリン ..... 5.0%  
3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メチル-1-メチル尿素 ..... 7.5%

そ の 他 の 有 機 溶 剤、界 面 活 性 剤 等 ..... 37.5%  
成 分 の 種 類 及 び 含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)  
の 範 囲 及 び  
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号  
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社  
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 兵庫県たつの市揖保町山下555  
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき 令和 7年 2月 12日 付けをもって上記のとおり  
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

| 作物名       | 適用雑草名 | 使用時期           | 適用土壌       | 使用量               |              | 本剤の使用回数 | 使用方法   | 適用地帯                           | ベンゾカーブを含む農薬の総使用回数 | ベンゾカーブを含む農薬の総使用回数 | リン酸を含む農薬の総使用回数                   |  |  |  |
|-----------|-------|----------------|------------|-------------------|--------------|---------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
|           |       |                |            | 薬量                | 希釈水量         |         |        |                                |                   |                   |                                  |  |  |  |
| だいず、えだまめ  | 一年生雑草 | は種直後(雑草発生前)    | 全土壌(砂土を除く) | 500～800<br>mℓ/10a | 70～100 ℓ/10a | 1回      | 全面土壌散布 | 全域                             | 1回                | 1回                | 2回以内(全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内) |  |  |  |
|           |       | 定植3日前まで(雑草発生前) |            | 500～700<br>mℓ/10a |              |         |        |                                |                   |                   |                                  |  |  |  |
| 小麦        |       | は種直後(雑草発生前)    |            | 400～600<br>mℓ/10a |              |         |        | 北海道                            |                   |                   | 1回                               |  |  |  |
| 大麦        |       |                |            | 500～700<br>mℓ/10a |              |         |        | 北海道を除く全域                       |                   |                   |                                  |  |  |  |
| とうもろこし    |       |                |            | 500～800<br>mℓ/10a |              |         |        | 全域                             |                   |                   |                                  |  |  |  |
| 飼料用とうもろこし |       |                |            | 500～800<br>mℓ/10a |              |         |        |                                |                   |                   |                                  |  |  |  |
| ばれいしょ     |       | 植付後～萌芽前(雑草発生前) |            | 600～800<br>mℓ/10a |              |         |        | 2回以内(は種直後は1回以内、にんじん3葉期以降は1回以内) |                   |                   |                                  |  |  |  |
| にんじん      |       | は種直後(雑草発生前)    |            | 500～700<br>mℓ/10a |              |         |        |                                |                   |                   |                                  |  |  |  |
| らっかせい     |       |                |            | 100 ℓ/10a         | 1回           |         |        |                                |                   |                   |                                  |  |  |  |