

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 23554 号

登 録 年 月 日 平成29年 10月 3日

農 薬 の 種 類 シアントラニプロール水和剤

農 薬 の 名 称 クミアイベネビアOD

物 理 的 類白色水和性粘稠懸濁液体
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の 3-ブロモ-1-(3-クロロ-2-ピリジル)-4'-シアノ-2'-メチル-6'-
種 類 及 び 含 有 量 (メチルカルバモイル)ピラゾール-5-カルボキシレート 10.3%

そ の 他 の 水、界面活性剤等 89.7%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 米国ジョージア州 バルトスタ ロッキーフォード・ロード 2509
名 称 及 び 所 在 地 コルバ・アグリサイエンス バルトスタ工場
シンガポール トゥアス ビュー サーキット 31
エフエムシーアグロ シンガポール社 シンガポール製剤工場
米国 ニューヨーク州 ミドルポート ナイガラストリート 100
エフエムシー・コーポレーション 同社工場
米国 ジョージア州 コーデレ フェンロード 434
ヘルナ・インダストリーズ社 コーデレ工場
インドネシア ジャワテンガ スマラン 50552 プリンカプス クレブ
P.T. ビナグナキマ
ドイツ 21683 スターデ スターデル エルプストラセ 28
ケミハ ドイツ GmbH & Co. KG 同社工場

小 分 製 造 場 群馬県高崎市小八木町313
新富士化成薬(株)群馬工場

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき 令和 7年1月15日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	7720フェリファールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナカ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトリ、ハイマダ、ラノメイガ、ウリハエ類、オオタバコガ、シロイチモンジヨトリ	2000～4000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)
	コナカ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトリ、ハイマダ、ラノメイガ、ウリハエ類、オオタバコガ、シロイチモンジヨトリ、アザミウマ類、アブラムシ類	20倍	1～2 Q /10a			無人航空機による散布	
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍	100～300 Q /10a			散布	
はくさい	コナカ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトリ、ハイマダ、ラノメイガ、ウリハエ類、シロイチモンジヨトリ	2000～4000倍	100～300 Q /10a			散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)
	コナカ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトリ、ハイマダ、ラノメイガ、ウリハエ類、シロイチモンジヨトリ、アブラムシ類、キスジノミハムシ	20倍	1～2 Q /10a			無人航空機による散布	
	アブラムシ類、キスジノミハムシ	2000倍	100～300 Q /10a			散布	
だいこん	コナカ、アオムシ、ハイマダ、ラノメイガ、ウリハエ類、ダクイコンハムシ	2000～4000倍	100～300 Q /10a			散布	4回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内)
	コナカ、アオムシ、ハイマダ、ラノメイガ、ウリハエ類、ダクイコンハムシ、アブラムシ類、ハモグリバエ類、キスジノミハムシ、ヨトウムシ	20倍	1～2 Q /10a			無人航空機による散布	
	アブラムシ類、ハモグリバエ類、キスジノミハムシ	2000倍	100～300 Q /10a			散布	
	ヨトウムシ	4000倍	100～300 Q /10a			散布	
ブロッコリー	コナカ、アオムシ、ハスモンヨトリ、シロイチモンジヨトリ	2000～4000倍	100～300 Q /10a			無人航空機による散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)
	コナカ、アオムシ、ハスモンヨトリ、シロイチモンジヨトリ、アザミウマ類、アブラムシ類	20倍	1～2 Q /10a			無人航空機による散布	
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍	100～300 Q /10a			無人航空機による散布	
トマト、ミニトマト	オオタバコガ	2000～4000倍	100～300 Q /10a			散布	5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	ハモグリバエ類、コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類、トマトキハカ	2000倍	100～300 Q /10a				
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類、ウリハエ類、ウリハムシ	2000倍	100～300 Q /10a			散布	4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
レタス、非結球レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトリ、ヨトウムシ、ウリハエ類、シロイチモンジヨトリ	2000～4000倍	100～300 Q /10a			無人航空機による散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)
	オオタバコガ、ハスモンヨトリ、ヨトウムシ、ウリハエ類、シロイチモンジヨトリ、ハモグリバエ類、アブラムシ類	20倍	1～2 Q /10a				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアンホウロコを含む農薬の総使用回数	
レタス、非結球レタス	ハモグリハエ類、アブラムシ類	2000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)	
ピーマン	オオタバコガ	2000～4000倍					4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)	
	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	2000倍						
ししとう	オオタバコガ	2000～4000倍					4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内)	
	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	2000倍						
いちご	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、チャクロハネナコハエ、キヒメコハエ						2000倍	4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	ハスモンヨトウ	2000～4000倍						
アスパラガス		4000倍						
	アザミウマ類	2000倍						
オクラ	アブラムシ類			収穫開始3日前まで			3回以内	
えだまめ	ハスモンヨトウ、マシシキイガ、アブラムシ類	2000～4000倍		0.8～2.4 Q /10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内)
		32倍						
だいず		2000～4000倍	100～300 Q /10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布			
		32倍			0.8～2.4 Q /10a			
さやいんげん	ハスモンヨトウ	4000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	ハモグリハエ類	2000倍						
	アズキノメイガ	2000～4000倍						
かぼちゃ	ハスモンヨトウ	4000倍	1～2 Q /10a			無人航空機による散布		
	ハモグリハエ類	2000倍				散布		
ねぎ	シロイモシヨトウ、アザミウマ類、ハモグリハエ類、ネキコガ	20倍	1～2 Q /10a			無人航空機による散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))	
	シロイモシヨトウ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類	2000倍	100～300 Q /10a			散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))	
たまねぎ	シロイモシヨトウ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、アザミウマ類	20倍	1～2 Q /10a			無人航空機による散布		
	アザミウマ類	2000～4000倍	100～300 Q /10a			散布		
	にんにく	アザミウマ類、ネキコガ、アブラムシ類	2000倍	1～2 Q /10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
20倍								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアンホウ酸 ロールを含む 農薬の総使用回数
やまのいも	アカイモガ、ハスモンヨトウ、アブラムシ類、コナジラミ類	4000倍	100～300 L / 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		40倍	1～3 L / 10a			無人航空機による散布	
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナガシロシタハ、アリモトキソウムシ、イモゾウムシ、ヨツモンカメノコハムシ、ヒルガオハモクシ、クハコナジラミ	4000倍	100～300 L / 10a			散布	
		40倍	1～2 L / 10a			無人航空機による散布	
ばれいしょ	ハスモンヨトウ	4000倍	100～300 L / 10a			散布	
	ハスモンヨトウ、アブラムシ類、シヤカイモガ	40倍	2～3.2 L / 10a			無人航空機による散布	
	アブラムシ類、シヤカイモガ	2000倍	100～300 L / 10a			散布	
にんじん	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300 L / 10a	収穫前日まで		無人航空機による散布	
	アブラムシ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アゲハ	40倍	1～2 L / 10a			散布	
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アゲハ	4000倍	100～300 L / 10a			無人航空機による散布	
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	2000倍	100～300 L / 10a			散布	
	アヲノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ、アブラムシ類	40倍	2～3.2 L / 10a			無人航空機による散布	
	アヲノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	2000～4000倍	100～300 L / 10a			散布	
なげこ	ヨトウムシ、タバコノミハムシ	4000倍	100～180 L / 10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内