

畑作のイネ科雑草の除草に…

クミアイ

生育期処理 除草剤

ナブ[®] 乳剤

生育期

50種類以上の登録作物に使用できます!



セトキシジム……20.0%

■人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

除草剤分類 1

- 特長
- ① イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)に優れた殺草効果を発揮します。
- ② 登録作物にかかっても影響はありません。ほとんどの登録作物に全面散布が可能です。
- ③ 浸透移行性に優れ、根まで枯らします。
- ④ 散布後に薬液が乾けば、降雨の影響はほとんどありません。
- ⑤ 土壌中では短時間で分解されるため、後作物への影響がありません。



農林水産省登録
第16225号

■適用雑草と使用方法

*使用時期は雑草の生育期であり、かつ適用雑草の葉期・草丈、およびその日
まで使用できる収穫前の日数を示す。

作物名・適用場所	適用雑草名	使用時期* (雑草生育期)	使用量 / 10a		使用方法	本剤及びセットキシムを含む 農薬の総使用回数			
			薬量(mL)	希釈水量(L)					
ばれいしよ	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ) ピラを除く	イネ科雑草3~5葉期	前日	150~200	100~150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	2回以内		
てんさい		イネ科雑草6~8葉期		200	100				
レドトツブ、シバムギ		(育苗期)	イネ科雑草1~3葉期	150~300 <small>(0.3~0.6m² ペーパーポット6冊)</small>	150 <small>(300m² ペーパーポット6冊)</small>			100~150	
		イネ科雑草6~8葉期	200	100					
だいず	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ) ピラを除く	イネ科雑草3~5葉期	30日	150~200	通常散布50~150 少量散布25~50	無人航空機に よる散布	1回		
かんしょ		イネ科雑草6~8葉期		200	通常散布50~100 少量散布25~50				
ごぼう		イネ科雑草9~10葉期	250~300	100~150	150~200	0.8~1.6			
		イネ科雑草3~5葉期	150~200						
やまのいも		イネ科雑草6~8葉期	200	100~150	150~200	100			
		あずき、いんげんまめ、たまねぎ	イネ科雑草3~5葉期					150~200	
そば		イネ科雑草6~8葉期	200	100~150	150~200	通常散布50~150 少量散布25~50		無人航空機に よる散布	
		にんじん	イネ科雑草3~5葉期						150~200
セルリー		イネ科雑草6~8葉期	200	100~150	150~200	0.8~1.6		雑草茎葉散布 又は 全面散布	
キャベツ、だいこん、はくさい		イネ科雑草3~5葉期	150~200						
こんいやく、なたね べにはないんげん		一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ) ピラを除く	イネ科雑草3~5葉期	60日	150~200	100~150		雑草茎葉散布 又は 全面散布	2回以内
すいか、トマト、豆類(未成熟) かぼちゃ、やまのいも(むかご)			イネ科雑草6~8葉期		200				
らっかせい	イネ科雑草3~5葉期		150~200	100~150	150~200	通常散布50~150 少量散布25~50			
えんどうまめ、さといも	イネ科雑草6~8葉期		200						
いちご	イネ科雑草3~5葉期		150~200	100~150	150~200	0.8~1.6			
レタス、カリフラワー、かぶ 非結球あぶらな科葉菜類 もりあざみ、ほうれんそう、にんにく	イネ科雑草6~8葉期		200						
ブロccoli	イネ科雑草3~5葉期		150~200	100~150	150~200	0.8~1.6			
ねぎ	イネ科雑草6~8葉期		200						
アスパラガス	イネ科雑草3~5葉期		150~200	100~150	150~200	100			
にら	イネ科雑草6~8葉期		200						
しょうが	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ) ピラを除く	イネ科雑草3~5葉期	7日	150~200	100~150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	2回以内		
食用ゆり		イネ科雑草6~8葉期		200					
ぎぼうし		イネ科雑草3~5葉期	150~200	100	150~200	100			
せり		イネ科雑草6~8葉期	200						
とりかぶと(薬用)		イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100			
はっか		イネ科雑草6~8葉期	200						
おけら		イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100			
おうぎ		イネ科雑草6~8葉期	200						
しゃくやく(薬用)		イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100			
せんきゅう		イネ科雑草6~8葉期	200						
とうき	イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100				
みしまさいこ	イネ科雑草6~8葉期	200							
キノア	イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100				
樹木類	イネ科雑草6~8葉期	200							
きく、いぐさ、すざ(床替床)、ひのき(床替床)	イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100				
わた	イネ科雑草6~8葉期	200							
りんどう	イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100				
チコリ	イネ科雑草6~8葉期	200							
チコリ(根株)	イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100				
桑	イネ科雑草6~8葉期	200							
たばこ	イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100				
樹木等	イネ科雑草6~8葉期	200							
公園、庭園、堤どう、 駐車場、道路、宅地 運動場 等	イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150	150~200	100				
ススキ、チガヤ	イネ科雑草6~8葉期	200							

⚠️使用上の注意事項(抜粋)

※いちごの使用時期は収穫開始14日前まで(収穫開始後は使用しない)。

- 広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。

- 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7~10日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。

包装 500mℓ×20本

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

(※本資料は、2025年7月現在の登録内容に基づいています。)



自然に学び 自然を守る
クミアイ化学工業株式会社
 本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL.03-3822-5036
 ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>



最新の登録内容とSDS
はこちらから