

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 22798 号

登 録 年 月 日 平成28年 10月 20日

農 薬 の 種 類 ビリフルキナゾン水和剤

農 薬 の 名 称 クミアイコルト顆粒水和剤

物 理 的 的 性 質 褐色水和性細粒

有 効 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量 1-アセチル-1, 2, 3, 4-テトラヒドロ-3-[(3-ヒリジルメチル)アミノ]-6-[1, 2, 2, 2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン-2-オン 20.0%

そ の 他 の 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量 鉍物質微粉、界面活性剤等 80.0%

適 用 病 害 虫 の 範 囲 及 び 使 用 方 法 (別記1のとおり)

製 造 者 又 は 輸 入 者 の 氏 名 及 び 住 所 東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 名 称 及 び 所 在 地 福島県二本松市平石高田4-286
株式会社ノーサービス 福島事業所
佐賀県三養基郡上峰町大字堤字二本杉180-1
株式会社ノーサービス 佐賀事業所

小 分 製 造 場 兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場
宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
クミアイ化学工業(株)小牛田工場

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき、令和 7年 6月 25日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフェノールを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	アブラムシ類	16倍	4 Q/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内	
		20倍	5 Q/10a					
		40倍	10 Q/10a					
		4000倍						
	チャノキイロアザミウマ、コナジラミ類、ミカンハエ成虫	3000倍						
りんご	カイガラムシ類(アカムカゲラムシを除く)	2000～3000倍						
	アカムカゲラムシ	2000倍						
	アブラムシ類	3000～6000倍						
なし	アブラムシ類、チュウゴクナシジラミ	4000倍						
	カイガラムシ類	3000～4000倍						
	チャノキイロアザミウマ	3000倍						
もも、初タシ	アブラムシ類	4000倍						
	カイガラムシ類	2000～3000倍						
かき	カイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ	3000倍						
ぶどう	カイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ、マダガスカロオオカミメ	3000倍						
キイロカマキリ	カイガラムシ類							
マンゴー	カイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ	2000倍						
おうとう	カイガラムシ類							
	オウトウショウジョウバエ	10000倍						
小粒核果類	アブラムシ類	2000～4000倍						
	カイガラムシ類	2000倍						
ばれいしょ	アブラムシ類	4000～8000倍	100～300 Q/10a					無人航空機による散布
		400倍	25 Q/10a					
		50倍	3.2 Q/10a					
かんしょ	コナジラミ類、アブラムシ類	4000倍	100～300 Q/10a			散布		
やまのいも、にがうり、かぼちゃ、こんにゃく								
てんさい	アブラムシ類	32倍	1.6 Q/10a			収穫7日前まで		無人航空機による散布
		40倍	2 Q/10a					
		64倍	3.2 Q/10a					
	4000～6000倍							
いちご	アブラムシ類、コナジラミ類	3000～4000倍	100～300 Q/10a	収穫前日まで	散布			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリフルメスを含む農薬の総使用回数	
トマト、ミニトマト、ちくわ、甘長とうがらし、きゅうり、メロン、すいか、かぼちゃ、ズッキーニ	アブラムシ類、コナジラミ類	4000倍	100～300 Q/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
なす	アブラムシ類、コナジラミ類、カミキリ類				2回以内		2回以内	
ピーマン、とうがらし類(甘長とうがらしを除く)	アブラムシ類、コナジラミ類				2回以内		2回以内	
しるしうり	コナジラミ類	アブラムシ類	16倍	1.6 Q/10a	無人航空機による散布	散布	3回以内	
キャベツ	20倍		2 Q/10a					
	32倍		3.2 Q/10a					
	3000～4000倍		100～300 Q/10a					
	ネギ・アザミ		3000倍					100～300 Q/10a
レタス	アブラムシ類	24倍	1.6 Q/10a	無人航空機による散布	散布	3回以内		
		30倍	2 Q/10a					
		48倍	3.2 Q/10a					
		3000～4000倍	100～300 Q/10a					
非結球レタス	アブラムシ類	24倍	1.6 Q/10a	無人航空機による散布	散布	3回以内		
		30倍	2 Q/10a					
		48倍	3.2 Q/10a					
		3000～4000倍	100～300 Q/10a					
ブロッコリー	アブラムシ類	25倍	1.6 Q/10a	無人航空機による散布	散布	3回以内		
		32倍	2 Q/10a					
		50倍	3.2 Q/10a					
		4000倍	100～300 Q/10a					
はくさい	アブラムシ類	24倍	1.6 Q/10a	無人航空機による散布	散布	3回以内		
		30倍	2 Q/10a					
		48倍	3.2 Q/10a					
		100～300 Q/10a						
アスパラガス	コナジラミ類、ネギ・アザミ、カミキリ類	4000倍	100～700 Q/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
食用ベソナス	アブラムシ類	4000～6000倍	100～300 Q/10a	収穫14日前まで			1回	1回
ヤングコーン				1回			1回	
豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)	アブラムシ類	4000～6000倍	100～300 Q/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
さやいんげん	コナジラミ類	4000倍						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリカブトを含む農薬の総使用回数
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	4000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		64倍	1.6～3.2 Q /10a			無人航空機による散布	
ねぎ	アブラムシ類、科アザミマ、科ハモグリハエ	16倍	1.6 Q /10a	収穫3日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		20倍	2 Q /10a				
		32倍	3.2 Q /10a				
		2000倍					
たまねぎ	科アザミマ、科ハモグリハエ	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
にら	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300 Q /10a				
	科アザミマ	2000倍		収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)	アブラムシ類	4000～6000倍		収穫3日前まで			
しょうようほおずき	コナジラミ類	4000倍					
茶	コナジラミ類		1000 Q /10a	摘採7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
	チャノミダリ、メコハ、チャノキイロアザミマ、コナジラミ、アブラムシ類	2000～3000倍	200～400 Q /10a				
	マダロアサミカメ、マダラサハラハムシ	2000倍					
チューリップ	アブラムシ類	40～120倍	3 Q /10a	発生初期	4回以内	無人航空機による散布	4回以内
花き類・観葉植物(チューリップを除く)	アブラムシ類、コナジラミ類	4000倍	100～300 Q /10a			散布	
たばこ	アブラムシ類			25～180 Q /10a	収穫10日前まで	2回以内	