

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 16225 号

登 録 年 月 日 平成30年 11月 30日

農 薬 の 種 類 セトキシジム乳剤

農 薬 の 名 称 クミアイナブ乳剤

物 理 的 淡褐色澄明可乳化油状液体
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の (土)-2-(1-エトキシイソブチル)-5-[2-(エチルチオ)プロピル]-3-ヒドロキシクロヘキサ-2-エノン .. 20.0%
種 類 及 び 含 有 量

そ の 他 の 有機溶剤、界面活性剤等 80.0%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 富山県高岡市向野本町300
名 称 及 び 所 在 地 日本曹達㈱高岡工場
茨城県潮来市島須3075-11
三愛理研㈱本社工場

小 分 製 造 場 兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業㈱龍野工場

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき、令和 7年 6月 25日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ヒシムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
あずき、いんげんまめ、たまねぎ			雑草生育期休耕 雑草3～5葉期 但し 収穫14日前まで	150～200mL /10a	100～150 Q /10a	2回以内		2回以内
			雑草生育期休耕 雑草6～8葉期 但し 収穫14日前まで	200mL/10a				
えんどうまめ、さといも			雑草生育期休耕 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで	150～200mL /10a	通常散布50～150 Q/10a 少量散布25～50 Q/10a		雑草茎葉散布 又は全面散布	
だいず			雑草生育期休耕 雑草6～8葉期 但し 収穫30日前まで	200mL/10a	通常散布50～100 Q/10a 少量散布25～50 Q/10a			
			雑草生育期休耕 雑草9～10葉期 但し 収穫30日前まで	250～300mL /10a				
			雑草生育期休耕 雑草3～5葉期 但し 収穫60日前まで					
べにばないんげん、 こんにゃく		一年生休耕雑草(スミカサを除く)	雑草生育期休耕 雑草3～5葉期 但し 収穫90日前まで	150～200mL /10a	100～150 Q /10a	1回		1回
らっかせい			雑草生育期休耕 雑草3～5葉期 但し 収穫14日前まで					
豆類(未成熟)、やまのいも(むかご)、すいか、かぼちゃ、トマト			雑草生育期休耕 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで					
			雑草生育期休耕 雑草6～8葉期 但し 収穫30日前まで					
かんしょ			雑草生育期休耕 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで	150～200mL /10a	0.8～1.6 Q /10a		無人航空機による散布	
			雑草生育期休耕 雑草6～8葉期 但し 収穫30日前まで	200mL/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	もやし玉を含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
ばれいしょ			雑草生育期(科雑草3～5葉期) 但し収穫前日まで	150～200mL/10a	100～150 L/10a	2回以内		2回以内	
			雑草生育期(科雑草6～8葉期) 但し収穫前日まで	200mL/10a	100 L/10a				
やまのいも			雑草生育期(科雑草3～5葉期) 但し収穫60日前まで	150～200mL/10a	100～150 L/10a				
			雑草生育期(科雑草6～8葉期) 但し収穫60日前まで	200mL/10a					
			雑草生育期(科雑草3～5葉期) 但し収穫14日前まで	150～200mL/10a					
キャベツ、はくさい、だいこん			雑草生育期(科雑草6～8葉期) 但し収穫14日前まで	200mL/10a	100 L/10a				
			雑草生育期(科雑草3～5葉期) 但し収穫7日前まで	150～200mL/10a	100～150 L/10a				
かぶ、カワナ、非結球あぶらな科葉菜類、にんにく、もりあざみ、ほうれんそう、レタス		一年生(科雑草(スズメカササゲを除く))	雑草生育期(科雑草3～5葉期) 但し収穫7日前まで	150～200mL/10a	100～150 L/10a	1回	雑草茎葉散布又は全面散布	1回	
ブロッコリー			雑草生育期(科雑草6～8葉期) 但し収穫7日前まで	200mL/10a	100 L/10a				
いちじく			雑草生育期(科雑草3～5葉期) 但し収穫開始14日前まで	150～200mL/10a	100～150 L/10a				
にんじん			雑草生育期(科雑草3～5葉期) 但し収穫14日前まで	200mL/10a					
			雑草生育期(科雑草6～8葉期) 但し収穫14日前まで						
セリ			雑草生育期(科雑草3～6葉期) 但し収穫28日前まで	150～200mL/10a		2回以内		2回以内	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	エトキシジフルを 含む農薬の 総使用回数
				薬量	希釈水量			
ごぼう			雑草生育期休科 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで	150～200mL /10a	100～150 Q /10a	1回		1回
			雑草生育期休科 雑草6～8葉期 但し 収穫30日前まで	200mL/10a	100 Q/10a			
ねぎ			雑草生育期休科 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで	150～200mL /10a	100 Q/10a			
			雑草生育期休科 雑草6～8葉期 但し 収穫30日前まで	200mL/10a	100 Q/10a			
しょうが			雑草生育期休科 雑草3～5葉期 但し 収穫7日前まで	150mL/10a	100～150 Q /10a			
			雑草生育期休科 雑草3～5葉期 但し 収穫前日まで	150～200mL /10a	100 Q/10a			
アスパラガス			雑草生育期休科 雑草3～5葉期 但し 収穫前日まで	150～200mL /10a	100 Q/10a	2回以内	雑草茎葉散布 又は全面散布	2回以内
			雑草生育期休科 雑草6～8葉期 但し 収穫前日まで	200mL/10a	100 Q/10a			
にら			雑草生育期休科 雑草3～5葉期 但し 収穫前日まで	150～200mL /10a	100～150 Q /10a			
			根株養成期の雑 草生育期休科雑 草3～5葉期 但し 根株掘上30日前 まで	150～200mL /10a	100～150 Q /10a			
チリ(根株)、食用ゆ り			雑草生育期休科 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで	150～300mL /10a(0.3～0.6 mL/㎡(ハートボット 6冊))	150 Q/10a(300 mL/㎡(ハートボット 6冊))			
			育苗期の雑草生 育期休科雑草1～ 3葉期(但し収穫 30日前まで)	150～300mL /10a(0.3～0.6 mL/㎡(ハートボット 6冊))	150 Q/10a(300 mL/㎡(ハートボット 6冊))			
てんさい			雑草生育期休科 雑草6～8葉期 但し 収穫30日前まで	200mL/10a	100 Q/10a	2回以内		2回以内
			雑草生育期休科 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで	150～200mL /10a	通常散布50～ 150 Q/10a 少 量散布25～50 Q/10a			
			雑草生育期休科 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで	300～400mL /10a	100～150 Q /10a			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	モトキンブを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
キア			雑草生育期イ科 雑草3～6葉期 但し 収穫14日前まで	150～200mQ /10a	100 Q /10a	2回以内		2回以内
そば			雑草生育期イ科 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで		通常散布50～ 150 Q /10a 少量 散布25～50 Q /10a		雑草茎葉散布 又は全面散布	
			雑草生育期イ科 雑草6～8葉期 但し 収穫30日前まで	200mQ /10a				
			雑草生育期イ科 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで	150～200mQ /10a	0.8～1.6 Q /10a	1回	無人航空機に よる散布	1回
			雑草生育期イ科 雑草6～8葉期 但し 収穫30日前まで	200mQ /10a				
			雑草生育期イ科 雑草3～5葉期 但し 収穫60日前まで					
なたね			雑草生育期イ科 雑草3～5葉期 但し 収穫60日前まで					
とりかぶと(薬用)			雑草生育期イ科 雑草3～5葉期 但し 収穫14日前まで		100～150 Q /10a			
とうき		一年生イ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期イ科 雑草3～6葉期 但し 収穫14日前まで			2回以内		2回以内
はっか			雑草生育期イ科 雑草3～5葉期 但し 収穫14日前まで		100 Q /10a			
みしまさいこ			雑草生育期イ科 雑草3～6葉期 但し 収穫30日前まで	150～200mQ /10a	100～150 Q /10a	4回以内(1年 間に2回以内)	雑草茎葉散布 又は全面散布	4回以内(1年 間に2回以内)
おうぎ			雑草生育期イ科 雑草3～6葉期			1回		1回
おけら			雑草生育期イ科 雑草3～5葉期 但し 収穫30日前まで		100 Q /10a	2回以内		2回以内
しゃくやく(薬用)			雑草生育期イ科 雑草3～6葉期 但し 収穫60日前まで			10回以内(1 年間に2回以内)		10回以内(1 年間に2回以内)
せんきゅう								
ぎぼうし			雑草生育期イ科 雑草3～5葉期 但し 収穫75日前まで		100～150 Q /10a	2回以内		2回以内
せり			雑草生育期イ科 雑草3～5葉期 但し 収穫60日前まで				雑草茎葉散布	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	トリシメを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
いぐさ		一年生休科雑草(スズメノカタビラを除く)	雑草生育期休科雑草3～5葉期	150～200mL/10a	100～150 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布又は全面散布	3回以内
桑			雑草生育期草丈20～30cm	200～250mL/10a	150～200 L/10a		雑草茎葉散布	
たばこ			雑草生育期 但し植付10日前まで、または植付後10日から大土寄せ期まで	150～200mL/10a	100～150 L/10a	1回	雑草茎葉畦面散布	1回
わた			雑草生育期休科雑草3～5葉期		100 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布又は全面散布	3回以内
さく			雑草生育期休科雑草3～6葉期					
りんどう								
樹木類								
すぎ(床替床)、ひのき(床替床)			雑草生育期休科雑草3～5葉期	150～400mL/10a	100～150 L/10a			
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等	スズメ、チガヤ	雑草生育期(草丈30cm)	200～400mL/10a	100～200 L/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内
			雑草生育期(草丈40cm)	500～1000mL/10a	150～200 L/10a		植栽地を除く樹木等の周辺地に局所散布	