



IBR剤 (Insect Behavior Regulator) 昆虫行動制御剤


農林水産省登録
第22798号

クミアイ コルト®

殺虫剤

顆粒水和剤

害虫防除の馬カアツプ!



無人航空機散布に対応



適用拡大

- キウイフルーツ (カイガラムシ類)
- マンゴー (カイガラムシ類)
- ズッキーニ (コナジラミ類)
- にら (アブラムシ類)
- 無人航空機による散布
- 未成熟とうもろこし



〈写真はイメージです〉

難防除害虫に高い効果!



モモアカアブラムシ



ヤノネカイガラムシ



タバココナジラミ



チャノキイロアザミウマ

かんきつ	トマト、ミニトマト	しょくほうおすき・食用ペンタス
りんご	なす	ばれいしょ
なし	ピーマン	かんしょ
もも、ネクタリン	オクラ	こんにゃく
かき	とうがらし類	やまのいも
ぶどう	ヤングコーン	てんさい
マンゴー	未成熟とうもろこし	キャベツ
おうとう	きゅうり、メロン	カリフラワー、ブロッコリー
小粒核果類	ズッキーニ	はくさい
キウイフルーツ	すいか、かぼちゃ	レタス
花き類・観葉植物	しろうり、にがうり	非結球レタス
たばこ	さやいんげん	ねぎ、たまねぎ
茶	豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)	アスパラガス
いちご	豆類(種実、らっかせいを除く)	にら

適用作物

適用病害虫および使用方法 が2025年6月に適用拡大になりました。

<2025年6月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アブラムシ類	16倍	4ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		20倍	5ℓ/10a				
	40倍	10ℓ/10a					
	アカマルカイガラムシ	2000倍					
りんご	カイガラムシ類(アカマルカイガラムシを除く) チャノキイロアザミウマ、コナジラミ類、ミカンバエ成虫	2000~3000倍					
		3000倍					
		4000倍					
なし	アブラムシ類	3000~6000倍					
		3000~4000倍					
		3000倍					
もも、ネクタリン	アブラムシ類	3000~4000倍					
		3000倍					
		4000倍					
かき	カイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ	2000~3000倍					
		3000倍					
ぶどう	カイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ、ツマグロアオカミカメ	3000倍					
キウイフルーツ	カイガラムシ類	3000倍					
マンゴー	カイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ	2000倍					
おうとう	オウトウショウジョウバエ	10000倍					
小粒核果類	カイガラムシ類	2000倍					
		2000~4000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類	4000~8000倍	100~300ℓ/10a				
		400倍	25ℓ/10a				
		50倍	3.2ℓ/10a				
かんしょ やまのいも、にがり、カリフラワー、こんにゃく	コナジラミ類、アブラムシ類	4000倍	100~300ℓ/10a				
		32倍	1.6ℓ/10a				
てんさい	アブラムシ類	40倍	2ℓ/10a				
		64倍	3.2ℓ/10a				
		4000~6000倍					
いちご	アブラムシ類、コナジラミ類	3000~4000倍					
		4000倍					
トマト、ミニトマト、オクラ、甘長とうがらし、きゅうり、メロン、ずいか、かぼちゃ	アブラムシ類、コナジラミ類	4000倍	100~300ℓ/10a				
		2回以内					
なす	アブラムシ類、コナジラミ類、カスミカメムシ類	4000倍					
		2回以内					
ピーマンとうがらし類(甘長とうがらしを除く)	アブラムシ類、コナジラミ類						
しろうり	コナジラミ類						
キャベツ	アブラムシ類	16倍	1.6ℓ/10a				
		20倍	2ℓ/10a				
	32倍	3.2ℓ/10a					
	3000~4000倍	100~300ℓ/10a					
レタス	ネギアザミウマ	3000倍					
		24倍	1.6ℓ/10a				
非結球レタス	アブラムシ類	30倍	2ℓ/10a				
		48倍	3.2ℓ/10a				
		3000~4000倍	100~300ℓ/10a				
ブロッコリー	アブラムシ類	24倍	1.6ℓ/10a				
		30倍	2ℓ/10a				
	48倍	3.2ℓ/10a					
	3000~4000倍	100~300ℓ/10a					
はくさい	アブラムシ類	25倍	1.6ℓ/10a				
		32倍	2ℓ/10a				
	50倍	3.2ℓ/10a					
	4000倍	100~300ℓ/10a					
アスパラガス	コナジラミ類、ネギアザミウマ、カスミカメムシ類						
食用ペンタス	アブラムシ類	4000倍					
スッキーニ	アブラムシ類、コナジラミ類						
ヤングコーン							
豆類(未成熟、ただし、さいいんげんを除く)	アブラムシ類	4000~6000倍	100~300ℓ/10a				
さいいんげん	コナジラミ類						
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	4000倍					
		64倍	1.6~3.2ℓ/10a				
		16倍	1.6ℓ/10a				
ねぎ	アブラムシ類、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ	20倍	2ℓ/10a				
		32倍	3.2ℓ/10a				
		2000倍					
たまねぎ	ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ						
にら	アブラムシ類	2000~4000倍	100~300ℓ/10a				
		2000倍					
豆類(種実、ただし、5つがせいを除く)	アブラムシ類	4000~6000倍					
しょくようほおすき	コナジラミ類	4000倍					
茶	クワシロカイガラムシ	2000~3000倍	1000ℓ/10a				
		2000倍	200~400ℓ/10a				
チューリップ	ツマグロアオカミカメ、マダラカサハラハムシ	2000倍					
花き類・観葉植物(チューリップを除く)	アブラムシ類	40~120倍	3ℓ/10a				
		4000倍					
たばこ	アブラムシ類	4000倍	100~300ℓ/10a				
		25~180ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内			

注意事項 ■石灰硫黄合剤、ポルデー液等のアルカリ性の強い薬剤との混用は避けてください。■植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないようによく散布してください。■ぶどうの幼果期以降に使用する場合は、果粒の落脱を生じるおそれがあるので注意してください。■西洋なしの品種ルレクチェエでは落花後から袋かけ前までの散布については果実に葉斑を生じるおそれがあるので使用を避けてください。■おうとうに使用する場合は、果実の汚れを生じるおそれがあるので注意してください。■ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。①ミツバチの巣箱及びその周辺に近づかないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。■無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。①散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。②散布に当たっては散布機種の適合した散布装置を使用してください。③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。④散布薬液の飛散によって自動車やカートなどの塗装等に被害を生じるおそれがある場合は、散布区域周辺の積物等に十分留意してください。⑤散布終了後は次の項目を守ってください。a) 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。b) 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。■本剤をばれいしょに対して希釈倍数400倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度運動式地上液剤散布装置を使用してください。■適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。■使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の指示を受け、また、誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の指示を受けさせてください。■眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。■眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の指示を受けてください。■水生動物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。■無人航空機による散布を使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。■散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水生動物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。 ●防除日誌を記載しましょう。