

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 23102 号

登 録 年 月 日 平成30年 8月 20日

農 薬 の 種 類 モリベンカルブ水和剤

農 薬 の 名 称 ファンタジスタ顆粒水和剤

物 理 的 淡褐色水和性細粒
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の モル=〔2-クロロ-5-〔(E)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシ)エチル〕ベンジル〕カルバマート 40.0%
種 類 及 び 含 有 量

そ の 他 の 鉍物質微粉、界面活性剤等 60.0%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業㈱小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業㈱龍野工場

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき 令和 7年 7月 9日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用病害虫 名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ピリベラム を含む農薬 の総使用回数 数
稲	いもち病	2000倍	360～150 Q /10a	収穫30日前 まで	1回		1回
小麦	眼紋病、赤さび病 赤かび病	2000～4000 倍		収穫14日前 まで			
りんご	黒星病、モリブ病、褐斑病、 斑点落葉病、すす点病、 黒点病、輪紋病	3000～4000 倍					
	すす斑病、うどんこ病、 炭疽病	3000倍					
おうとう	灰星病、幼果菌核病、褐 色せん孔病、黒斑病				3回以内		3回以内
なし	心腐れ症(胴枯病菌)、黒 星病、黒斑病、輪紋病	3000～4000 倍		収穫前日ま で			
	炭疽病、褐色斑点病	3000倍					
もも、初刈り	灰星病、紅アシ腐敗病、 黒星病	3000～4000 倍				散布	
	うどんこ病						
小粒核果類(うめを除く)	灰星病、黒星病	3000倍	200～700 Q /10a		2回以内		2回以内
うめ	灰星病、黒星病、灰色か び病、すす斑病						
ぶどう	灰色かび病、晚腐病、黒 とう病	3000～4000 倍		収穫14日前 まで	3回以内		3回以内
	さび病、うどんこ病、褐 斑病	3000倍					
ブルーベリー	灰色かび病	4000倍		収穫前日ま で	2回以内		2回以内
かんきつ	灰色かび病、そうか病、 黒点病	2000～4000 倍		収穫14日前 まで			
	炭疽病(さび果)	2000倍					
かき	灰色かび病、落葉病、う どんこ病、炭疽病	3000～4000 倍		収穫7日前ま で			
イチゴ	すす斑病、灰色かび病	4000倍		収穫前日ま で			
豆類(種実、ただし、だいず、あ ずき、いんげんまめ、えんどう まめ、らっかせい、そらまめを 除く)		2000倍	100～300 Q /10a				
		32～64倍	3.2 Q /10a	収穫7日前ま で		無人航空機に よる散布	
		64～128倍	6.4 Q /10a				
	菌核病、灰色かび病	2000倍	100～300 Q /10a		3回以内	散布	3回以内
豆類(未成熟、ただし、えだま め、さやいんげん、さやえん どう、未成熟そらまめを除く)		32～64倍	3.2 Q /10a	収穫前日ま で		無人航空機に よる散布	
		64～128倍	6.4 Q /10a				
	灰色かび病、菌核病、赤 色斑点病、さび病	2000倍	100～300 Q /10a			散布	
		32～64倍	3.2 Q /10a	収穫7日前ま で			
そらまめ	菌核病、灰色かび病	64～128倍	6.4 Q /10a			無人航空機に よる散布	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリペンカブを含む農薬の総使用回数	
未成熟そらまめ	灰色かび病、菌核病、赤色斑点病、さび病	2000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	菌核病、灰色かび病	32～64倍	3.2 Q /10a			無人航空機による散布		
		64～128倍	6.4 Q /10a					
だいず	紫斑病	2000～4000倍	100～300 Q /10a	収穫7日前まで		散布		
	菌核病、灰色かび病	2000倍						
		32～64倍	3.2 Q /10a			無人航空機による散布		
		64～128倍	6.4 Q /10a					
えだまめ	紫斑病	2000～4000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで		散布		
	菌核病、灰色かび病	2000倍						
		32～64倍	3.2 Q /10a			無人航空機による散布		
		64～128倍	6.4 Q /10a					
あずき	灰色かび病、菌核病、炭疽病、さび病	2000倍	100～300 Q /10a	収穫7日前まで		散布		
	菌核病、灰色かび病	32～64倍	3.2 Q /10a			無人航空機による散布		
		64～128倍	6.4 Q /10a					
いんげんまめ	灰色かび病、菌核病、炭疽病	2000倍	100～300 Q /10a			散布		
	菌核病、灰色かび病	32～64倍	3.2 Q /10a			無人航空機による散布		
		64～128倍	6.4 Q /10a					
えんどうまめ	灰色かび病、菌核病、さび病	2000倍	100～300 Q /10a			散布		
	菌核病、灰色かび病	32～64倍	3.2 Q /10a			無人航空機による散布		
		64～128倍	6.4 Q /10a					
さやいんげん	灰色かび病、菌核病、炭疽病	2000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで		散布		
	菌核病、灰色かび病	32～64倍	3.2 Q /10a			無人航空機による散布		
		64～128倍	6.4 Q /10a					
さやえんどう	灰色かび病、菌核病、さび病	2000倍	100～300 Q /10a			散布		
	菌核病、灰色かび病	32～64倍	3.2 Q /10a			無人航空機による散布		
		64～128倍	6.4 Q /10a					
トマト、ミニトマト	灰色かび病、菌核病、葉かび病、さびかび病、斑点病	2000～3000倍	100～300 Q /10a					散布
	立枯病	2000倍						
なす	灰色かび病、菌核病、黒枯病、褐色斑点病	2000～3000倍						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリベンカルブを含む農薬の総使用回数				
なす	すすかび病、アザミ立枯病、うどんこ病、褐色円星病、褐紋病	2000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内				
ピーマン	斑点病、黒枯病	4000倍		収穫3日前まで							
きゅうり	灰色かび病、菌核病	2000～3000倍									
レタス	すす枯病	2000倍		収穫14日前まで							
非結球レタス	灰色かび病、菌核病	2000～3000倍									
	すす枯病	2000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内				
しそ	斑点病	3000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内				
いちご	灰色かび病	2000～3000倍		収穫前日まで							
	炭疽病	2000倍									
キャベツ	灰色かび病、菌核病	2000～3000倍		収穫3日前まで							
	黒斑病、根朽病、株腐病	2000倍									
はくさい	菌核病、炭疽病、黒斑病、白斑病	3000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内				
はなやさい類	菌核病、黒すす病										
アスパラガス	茎枯病、斑点病、褐斑病				3回以内		5回以内(株元灌注は2回以内、散布は3回以内)				
くきちしゃ	灰色かび病										
ねぎ	小菌核腐敗病、さび病、黒斑病、葉枯病、小菌核病、黒腐菌核病、白絹病	1000倍	1 Q /㎡	収穫21日前まで	2回以内	株元灌注					
	黒腐菌核病、白絹病										
たまねぎ	灰色かび病、小菌核病	2000～4000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内(定植前は1回以内)				
		2000～3000倍									
	灰色腐敗病	1000～2000倍		定植直前	1回	5分間苗根部浸漬 5分間セリ苗浸漬					
にんにく	葉枯病、白斑葉枯病、黄斑病、さび病	3000倍	100～300 Q /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内				
にら	白斑葉枯病、褐色葉枯病、さび病			収穫前日まで							
にんじん	黒葉枯病、斑点病、菌核病、うどんこ病			収穫3日前まで							
オクラ	葉すす病、灰色かび病、うどんこ病	2000倍		収穫前日まで							
茶	炭疽病、輪斑病、新梢枯死症、褐色円星病	3000倍	200～400 Q /10a	摘採7日前まで	1回		1回				
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)	灰色かび病		100～300 Q /10a	発病初期	5回以内		5回以内				
きく	灰色かび病、白さび病										
トルコギキョウ	灰色かび病、斑点病	3000倍	100～300 Q /10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内				