

ファルコンTMフロアブル

園芸用殺虫剤

米国へ輸出するお茶に使用できるようになりました！

メトキシフェノジド(商品名:ファルコンフロアブル)の米国の「茶」における残留農薬基準値(インポートトレランス)が設定されました。
台湾・香港の「茶」へも残留農薬基準値が設定されています。



チョウ目害虫にユニークな作用。
アメリカ・台湾・香港への
輸出用茶葉づくりにも！

園芸用殺虫剤

① ユニークなIGR剤

チョウ目害虫の脱皮を促進させ、すばやく摂食停止状態へ。キチン質合成阻害剤とくらべ、速効的な殺虫効果を発揮します。

② 有用昆虫に影響が少ない

ケナガカブリダニ、ナミテントウ、アシナガグモ、オオヒメグモなどの各種捕食性天敵への影響が少ない薬剤です。

③ IPM (総合防除) に最適

ユニークな作用性と、天敵をはじめ作物や人畜に対する優れた安全性から、IPMにピッタリです。

■ファルコンフロアブルの効き方



■ファルコンフロアブルの輸出用茶 基準値 (ppm)

日本	米国	欧州	台湾	香港
40	20	0.05	10	20

■適用害虫と使用方法 (抜粋)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り 使用液量(ℓ)	使用時期	本剤及びメトキシフェノジドを 含む農薬の総使用回数	使用方法
茶	チャハマキ	4,000	200～400	摘採7日前まで	2回以内	散布
	チャノホソガ チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシヤク	4,000～8,000				
	ハスモンヨトウ	8,000				

■試験成績

チャハマキ

農林水産省 野菜・茶試験場 1994年

供試薬剤	希釈倍数 (倍)	防除価
ファルコンフロアブル	4,000	82
A 剤	2,000	32

品 種：やぶきた 散布月日：7月18日
発生量：多 調査月日：8月2日

チャノホソガ

鹿児島県茶業試験場 1997年

供試薬剤	希釈倍数 (倍)	防除価
ファルコンフロアブル	4,000	90
B 剤	1,500	31

品 種：するがわせ 散布月日：7月30日
発生量：中 調査月日：8月12日

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。散布機具及び容器の洗浄水などは、河川などに流さないでください。また、空容器などは環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 桑に付着するおそれのある地域では使用しないでください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は、ほ場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2025年7月現在の知見に基づき、作成されています。