

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 18829 号

登 録 年 月 日 平成30年 11月 21日

農 薬 の 種 類 プロヘキサジオンカルシウム塩水和剤

農 薬 の 名 称 ビビフルフロアブル

物 理 的 類白色水和性粘稠懸濁液体
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の カルシウム=3-オキシ-5-オキソ-4-プロピル-6-ヘキサ-3-エンカルボキシレート 1.0%
種 類 及 び 含 有 量

そ の 他 の 水、界面活性剤等 99.0%
成 分 の 種 類 及 び 含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 兵庫県たつの市揖保町山下555
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業(株)龍野工場

小 分 製 造 場 静岡県磐田市塩新田432-3
(株)理研グリーン福田工場

令和 7年 8月 6日 付けをもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	使用目的	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アピサジノカサミ塩を含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
水稻	節間短縮による倒伏軽減	75～100mL/10a	通常散布50～150 L/10a	出穂10～2日前	1回	茎葉散布	1回
			少量散布 25～50 L/10a				
		100mL/10a	800mL/10a			無人ヘリコプターによる散布	

(別記1)

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	2,4-ジクロロベン ジカルブ酸を 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	伸長抑制による 苗の徒長防止	50～100倍	セル成型育苗トレイ箱またはペー パーポット1冊(30cm×60cm、使 用土壌約3Q)当り50～100mL	育苗期(子葉～本 葉2葉期)		茎葉散布	1回
いちご(促成栽培)	葉柄伸長抑制に よる苗の徒長防 止	200～500倍	5～10mL/株	苗の低温暗黒処 理7日前～当日	1回		4回以内(本圃定植前 は1回以内、本圃定植 後は3回以内)
		500倍		定植30～50日前			
	生育後期の伸長 抑制	400～600倍	10～25mL/株	葉柄徒長期但し、 収穫前日まで	3回以内		
ストック	開花促進	1000倍	100Q/10a	葉数10～14枚時 とその7～10日後	2回		2回以内
きく	花首伸長抑制	200～500倍	50～100Q/10a	摘蕾期	1回		
				発蕾期及び摘蕾 期	2回		
フアンネアラー(ポット・ プランター等の容器栽 培)	花芽形成促進	500倍	3～5mL/株	摘芯または整枝 後	2回以内		