

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 17168 号

登 録 年 月 日 平成28年 1月 19日

農 薬 の 種 類 エトフェンプロックス乳剤

農 薬 の 名 称 クミアイトレボン乳剤

物 理 的 淡黄色澄明可乳化油状液体
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の 2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル-3-フェノキシベンゾルエーテル 20.0%
種 類 及 び 含 有 量

そ の 他 の 有機溶剤、界面活性剤等 80.0%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 福島県二本松市平石高田4-286
名 称 及 び 所 在 地 ㈱ニチノサービス 福島事業所
佐賀県三養基郡上峰町大字堤字二本杉180-1
㈱ニチノサービス 佐賀事業所
静岡県磐田市塩新田432-3
㈱理研グリーン福田工場
宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
クミアイ化学工業㈱小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業㈱龍野工場
兵庫県赤穂市加里屋1125
ハヤシアグロサイエンス㈱赤穂工場

令和 7年 8月 27日 付けをもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	
稲		コブノメイガ	1000倍	60～150 Q /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
		ツマク・ロヨコハ・イ、ウナカ類、イト・ロイムシ、イトコ類	1000～2000倍						
		カメシ類、イネミス・ゾウムシ	2000倍						
		ウナカ類	300～600倍	25 Q /10a					
		ツマク・ロヨコハ・イ、イネミス・ゾウムシ、イト・ロイムシ	300倍						
		カメシ類	600倍						
麦類		ヒメトビ・ウナカ、アブラムシ類	2000倍	60～150 Q /10a	2回以内	2回以内			
きび		アカシゲ・カスミカメ		100～300 Q /10a	3回以内	3回以内			
あわ		アヲヨトウ、アヲノメイガ							
とうもろこし									
飼料用とうもろこし(子実)		アヲノメイガ、アヲヨトウ、ツマシ・ロヨコハ・イ	1000倍		収穫7日前まで	4回以内		4回以内	
かんきつ		コアオハナムグリ、ケシキスイ類		200～700 Q /10a	収穫前日まで	3回以内			3回以内
		ミカンハモグ・リガ	1000～2000倍						
			2000倍						
マンゴー		チャ・キイロアザミウマ	1000倍		収穫7日前まで	3回以内			3回以内
ブロッコリー		アオムシ	1000～2000倍	収穫前日まで					
キャベツ				収穫3日前まで					
はくさい		アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類			収穫7日前まで	2回以内			2回以内
だいこん			1000～2000倍	収穫21日前まで					
ねぎ		シロイモシ・ヨトウ							
ナス		アブラムシ類			収穫14日前まで	3回以内			3回以内
すいか		アブラムシ類、コナシ・ラミ類、ハモン・ヨトウ、ヨトウムシ		収穫3日前まで					
きゅうり				収穫前日まで					
メロン		アブラムシ類、コナシ・ラミ類	1000倍		収穫3日前まで	4回以内		4回以内	
にがうり		アブラムシ類、コナシ・ラミ類、ヨトウムシ類、カメシ類、ウナカ類		100～300 Q /10a		3回以内			3回以内
かぼちゃ		コナシ・ラミ類、ウナカ類							
なす		アブラムシ類	1000～2000倍						
トマト		コナシ・ラミ類	1000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内	
ピーマン		アブラムシ類				3回以内		3回以内	
オクラ		アブラムシ類、カメシ類							
さやえんどう、実えんどう		シロイモシ・ヨトウ、ヨトウムシ、ウナカミシ	1000倍			2回以内			2回以内
さやいんげん		ウナカアブラムシ、ウナカミシ、マメノメイガ							

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロシメを含む農薬の総使用回数
えだまめ		マシクイカ、シイモシマクイカ、タイズサヤタマハエ、カメムシ類、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイカ、ツメクサ	1000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
未成熟さげばれいしょ		ハスモンヨトウ	1000～2000倍		収穫前日まで			
かぶしよ		アブラムシ類			収穫7日前まで			
さといも		ナジメロシタハ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、ヒルガオハモグリカ			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
さといも(薬柄)、しょうが、薬しょうが		ハスモンヨトウ			収穫7日前まで			
やまのいも、やまのいも(むかご)		アブラムシ類、ヤマノイモカ、ハスモンヨトウ						
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く)		マシクイカ、アブラムシ類、シイモシマクイカ、タイズサヤタマハエ、カメムシ類、フタスジヒメハムシ、ハスモンヨトウ、ウラナミシジミ、アズキノメイカ	1000倍					
だいず		マシクイカ、アブラムシ類、シイモシマクイカ、タイズサヤタマハエ、カメムシ類、フタスジヒメハムシ、ハスモンヨトウ、ウラナミシジミ、アズキノメイカ、ウコンノメイカ、ツメクサ		100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
あずき		マシクイカ、アブラムシ類、シイモシマクイカ、タイズサヤタマハエ、カメムシ類、フタスジヒメハムシ、ハスモンヨトウ、ウラナミシジミ、ノメイカ類						
ほうきぎ		ホリキツツミカ			収穫30日前まで			
てんさい		ヨウムシ	1000～2000倍			3回以内		3回以内
せんきゅうモハヤ		ウラムシトキ			収穫14日前まで	1回		1回
あしたば		アザミ類	1000倍					
ふき		アブラムシ類	2000倍			3回以内		3回以内
うど		コジラミ類、フタスジヒメハムシ、ヨウムシ			根株養成期 但し、収穫45日前まで			
みつば		アブラムシ類	1000倍		収穫21日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで	2回以内		2回以内
食用ぎく			2000倍		収穫3日前まで			

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロキシを含む農薬の総使用回数			
じゅんさい	じゅんさい田	マダラアザミ、ジュンサイハムシ	1000倍	100～150 Q /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内			
せり	水田	アブラムシ類			1000倍				100～150 Q /10a	収穫30日前まで	3回以内
せり(水耕栽培)	ガラス室等の施設							みずいも		水田	
茶		チャノボカ、チャノミドリヒメコハ、チャノキアザミ	2000倍	200～400 Q /10a	摘採21日前まで	2回以内		2回以内			
たばこ		タバコガ、ヨトウムシ	1000～2000倍	25～180 Q /10a	収穫10日前まで				4回以内(1年間に2回以内)	4回以内(1年間に2回以内)	
おうぎ		ウリハムシ・モトキ				1000倍		100～300 Q /10a			収穫45日前まで
とうき		キゲハ	1000倍	100～300 Q /10a	6回以内				6回以内		
採種用とうき					12回以内(1年間に6回以内)	12回以内(1年間に6回以内)					
樹木類(つつじ類、ボインセア、ソテツを除く)		ケムシ類、シャクトリムシ類	4000倍	100～700 Q /10a	幼虫発生期	6回以内		6回以内			
つつじ類		オビ・カレハ	2000倍		-						
		ケムシ類、シャクトリムシ類	4000倍		-						
		オビ・カレハ	2000倍		-						
ボインセア		ケムシ類、シャクトリムシ類	4000倍		幼虫発生期				6回以内	6回以内	
		オビ・カレハ	2000倍		-						
		コナシラミ類	1000倍		-						
ソテツ	ケムシ類、シャクトリムシ類	4000倍	幼虫発生期		6回以内				6回以内		
	オビ・カレハ	2000倍	-								
	クロマダラソテツジミ	2000～4000倍	-								
宿根かすみそう	シロイチモンシ・ヨトリ	1000倍	100～300 Q /10a	発生初期							
りゅうじょう	ヨトウムシ	2000倍						100～300 Q /10a	発生初期		
きく、カーネーション	ヒラス・ハナアザミ										
ゆり		ハスモンヨトリ	1000倍								
トルコギキョウ											
水田作物、畑作物(休耕田)	ヨシ、ササ、ススキ、セイタカアワダチ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	2000倍	60～150 Q /10a	-	3回以内			3回以内		