

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 18220 号

登 録 年 月 日 平成28年 11月 4日

農 薬 の 種 類 イミダクロプリド粒剤

農 薬 の 名 称 クミアイアドマイヤー1粒剤

物 理 的
化 学 的 性 状 類白色細粒

有 効 成 分 の
種 類 及 び 含 有 量 1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン 1.0%

そ の 他 の
成 分 の 種 類 及 び
含 有 量 鉍物質微粉等 99.0%

適 用 病 害 虫
の 範 囲 及 び
使 用 方 法 (別記1のとおり)

製 造 者 又 は
輸 入 者 の
氏 名 及 び 住 所 東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の
名 称 及 び 所 在 地 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
クミアイ化学工業㈱小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業㈱龍野工場
広島県尾道市長者原2-160
クミアイ化学工業㈱尾道工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり、
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イダグカズリドを含む農薬の総使用回数
稲		シロアガリコバエ、カキ類	3kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時(直播)又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)
かんきつ(苗木)		ミカンハダカダニ	20g/樹(但し、6kg/10aまで)	育苗期		株元散布	1回
えだまめ		アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5～4Q)当り50g	は種時		本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの培土に均一に混和する。	
			3kg/10a			播溝土壌混和	3回以内(定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
			2g/植穴(但し、6kg/10aまで)	定植時		植穴土壌混和	
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)			3kg/10a	は種時		播溝土壌混和	
さやいんげん			1～2g/株(但し、6kg/10aまで)	定植時又はは種時		植穴土壌混和	3回以内(定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内)
			3kg/10a	は種時		播溝土壌混和	
未成熟そらまめ			2g/植穴(但し、6kg/10aまで)	定植時		植穴土壌混和	
			1g/株	育苗期後半		株元散布	
きゅうり		アブラムシ類、アザミウマ類	1～2g/株	定植時	1回	植穴又は株元土壌混和	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内)
		コナジラミ類	2g/株			植穴土壌混和	
		アブラムシ類	5g/株(但し、3kg/10aまで)			株元土壌混和	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
			1～5g/株(但し、3kg/10aまで)			植穴土壌混和	
すいか		アザミウマ類	1～2g/株(但し、3kg/10aまで)				
メロン		アブラムシ類	1g/株	育苗期後半		株元散布	
		アブラムシ類、アザミウマ類	1～2g/株	定植時		植穴又は株元土壌混和	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)
		コナジラミ類					
		コナジラミ類、アザミウマ類	2g/株			植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
かぼちゃ							
にがうり		アブラムシ類	1～2g/株			植穴又は株元土壌混和	2回以内(定植時の土壌混和は1回以内)
まくわうり			1g/株			植穴土壌混和	1回
		コナジラミ類	0.5～1g/株	育苗期後半		株元散布	
トマト、ミニトマト		アブラムシ類、コナジラミ類	1～2g/株	定植時		植穴土壌混和	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シシガキリを含む農薬の総使用回数		
ピーマン、とうがらし類		アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	1回	株元散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)		
		アブラムシ類、アザミウマ類	1～2g/株	定植時		植穴又は株元土壌混和			
なす		アブラムシ類	1g/株	育苗期後半		1回	株元散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計2回以内)	
		アブラムシ類、アザミウマ類	1～2g/株	定植時			植穴又は株元土壌混和		
わけぎ、あさつき		アザミウマ類	4kg/10a	定植時			植溝土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
ねぎ								3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内)	
はくさい、キャベツ		アブラムシ類	0.5g/株				植穴土壌混和	3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内)	
ブロッコリー								4回以内(育苗期の灌水は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、定植後の処理は2回以内)	
レタス			育苗期後半	株元散布			3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内)		
だいこん			3～6kg/10a	は種時			播溝土壌混和	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、は種後の処理は2回以内)	
ほうれんそう、かぶ			4kg/10a					3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
ごぼう		アザミウマ類、アブラムシ類	0.5g/株	収穫7日前まで	2回以内		株元散布	1回	
いちじ				育苗期後半	植穴土壌混和				
パセリ				定植時	1回	植穴土壌混和	2回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は1回以内)		
				は種時		播溝散布			
				株元散布					
こんにゃく		アブラムシ類	3kg/10a	培土時(基根伸長期)	2回以内	株元土壌混和	3回以内(培土時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)		
			3～6kg/10a	生育期 但し収穫21日前まで		茎葉散布			
			6kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内)		
4kg/10a									
さといも、さといも(葉柄)、ばれいしょ		クワイバレーアブラムシ	3kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布			
れんこん		クワイバレーアブラムシ	4kg/10a						

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イカリガリドを含む農薬の総使用回数				
かんしょ	-	コガネムシ類	4～6kg/10a	植付前	1回	作条土壌混和	3回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)				
			6kg/10a			全面土壌混和					
やまのいも		アブラムシ類、コガネムシ類	4kg/10a	植付時		1回	植溝土壌混和	3回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後の処理は2回以内)			
やまのいも(むかご)		コガネムシ類							1回		
にら		アザミウマ類							定植時	2回以内(定植時の土壌混和は1回以内、株元散布は1回以内)	
にら(花茎)		ネアザミウマ							収穫30日前まで		株元散布
									定植時		植溝土壌混和
			収穫30日前まで	株元散布							
じゅんさい		じゅんさい田	ユスリカ類	3kg/10a		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
ごま						は種時	1回	播溝土壌混和	1回		
花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニア、レザーファンを除く)			アブラムシ類	2g/株(但し、6kg/10aまで)		生育期	5回以内	株元散布	5回以内		
きく		アザミウマ類	3kg/10a	散布							
		アブラムシ類	2g/株(但し、6kg/10aまで)	株元散布							
ばら		イカリガリド、コガネムシ類		株元土壌混和							
				株元散布							
ペチュニア	アブラムシ類	1g/株(但し、3kg/10aまで)	定植時	1回	植穴土壌混和						
レザーファン	アザミウマ類		株元土壌混和								
キンセンカ	アブラムシ類	2g/株(但し、6kg/10aまで)	生育期	5回以内	株元散布						
	コナジラミ類	1g/株(但し、3kg/10aまで)			株元土壌混和						
つつじ類		コガネムシ類	4kg/10a	植付時又は植替時	2回以内	作条土壌混和	5回以内(株元灌注は2回以内、土壌混和は2回以内)				
		ツツジケンハイ	6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布					
樹木類(つつじ類を除く)		コガネムシ類	4kg/10a		2回以内	作条土壌混和	2回以内				
たばこ		アブラムシ類	3kg/10a(1g/株)	植付時	1回	植穴土壌混和	2回以内(植付時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内)				