

農薬登録票

登録番号 第 14298 号

登録年月日 平成28年 5月 20日

農薬の種類 プロメトリン・ベンチオカーブ粒剤

農薬の名称 サターンバアロ粒剤

物理的
化学的性状 灰白色細粒

有効成分の種類及び含有量	2-メチルオ-4,6-ビス(イソプロピルアミノ)-s-トリアジン	0.80%
	S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルカーバメート	8.0%

その他の成分の種類及び含有量	鉱物質等	91.2%
----------------	------	-------

適用病害虫及び使用方
法 (別記1のとおり)

製造者又は輸入者の氏名及び住所 東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

製造場の名称及び所在地 広島県尾道市長者原2-160
クミアイ化学工業(株)尾道工場
宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
クミアイ化学工業(株)小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロメリンを含む農薬の総使用回数	ベンチカルブを含む農薬の総使用回数	
直播水稻	一年生雑草、マツバ	は種直後～稲出芽前(ノビエ発生始期まで)(入水15日前まで)	4～6kg/10a	1回	乾田・落水状態で全面土壌散布	1回	2回以内(入水前は1回以内、入水後は1回以内)	
小麦	一年生雑草	は種後～出芽前(雑草発生前)	3～6kg/10a		全面土壌散布	2回以内	1回	
		生育初期(小麦の4葉期まで、スズメノテッポウ1.5葉期まで)						
大麦		は種後～出芽前(雑草発生前)	3～5kg/10a			1回		
		生育初期(大麦の4葉期まで、スズメノテッポウ1.5葉期まで)						
とうもろこし		は種直後	4～6kg/10a			1回		
だいず		は種後～出芽前(雑草発生前)				2回以内		
らっかせい		は種直後(雑草発生前)						
にんじん		定植直後(雑草発生始期まで)				4～5kg/10a		1回
たまねぎ								
ねぎ								
つつじ類、つばき類		植付後(雑草発生前)	4～6kg/10a	3回以内	3回以内	3回以内		
桑		春期発芽前又は夏切後(雑草発生前)	5～6kg/10a	2回以内	2回以内	2回以内		