

農薬登録票

登録番号 第 14493 号

登録年月日 平成29年 3月 14日

農薬の種類 ベノミル・TPN水和剤

農薬の名称 クミアイダコレート水和剤

物理的 類白色水和性粉末 63 μ m以下
化学的 性状

有効成分の種類及び含有量
メチル-1-(フチルカルバモイル)-2-ベンゾイミダゾールカーバメート 20.0%
テトラクロイソフタロニトリル 50.0%

その他の成分の種類及び含有量
鋳物質微粉、界面活性剤等 30.0%

適用病害虫 (別記1のとおり)
の範囲及び
使用方法

製造者又は輸入者の氏名及び住所
東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

製造場の名称及び所在地
広島県尾道市長者原2-160
クミアイ化学工業(株)尾道工場
宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
クミアイ化学工業(株)小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペニシリンを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病(苗いもち)	400倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5Q)1箱当り0.5Q	は種時	1回	灌注	2回以内(種子への処理は1回以内、床土への混和は1回以内)	2回以内
	苗立枯病(リゾクトニア菌)、苗立枯病(リゾクトニア菌)、苗立枯病(ファリウム菌)	400～600倍		は種時から緑化期 但し、は種14日後まで	2回以内			
		800～1200倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5Q)1箱当り1Q					
もも	黒星病、枝折病、すすかび病	1000倍	200～700Q/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内	6回以内
	灰星病、根腐病、果実赤点病	1000～1500倍						
ブロッコリー	べと病、菌核病	1000倍	100～300Q/10a	出蕾前(但し、収穫21日前まで)	2回以内		4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)	3回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
アスパラガス	茎枯病、斑点病		100～500Q/10a	収穫終了後	4回以内		5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内)	4回以内
たまねぎ	灰色かび病	800倍	100～300Q/10a	収穫7日前まで	6回以内		8回以内(種子粉衣は1回以内、育苗培土混和、灌注または苗根部浸漬は合計1回以内、散布は6回以内)	6回以内
ナス	べと病、灰色かび病、すす枯病	1500倍		収穫14日前まで	3回以内		5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内)	5回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
キャベツ	根朽病、菌核病、べと病	1000倍			収穫7日前まで		2回以内	7回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は6回以内)
はくさい	黒斑病、べと病、菌核病							3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)