

農薬登録票

登録番号 第 17733 号

登録年月日 平成29年 11月 7日

農薬の種類 テフルベンズロン乳剤

農薬の名称 クミアイノーモルト乳剤

物理的・化学的性状 淡黄色澄明可乳化油状液体

有効成分の種類及び含有量 1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素 5.0%

その他の成分の種類及び含有量 有機溶剤、界面活性剤等 95.0%

適用病害虫の範囲及び使用方法 (別記1のとおり)

製造者又は輸入者の氏名及び住所 東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

製造場の名称及び所在地 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
クミアイ化学工業(株)小牛田工場
長野県長野市大字富竹字弘誓173-2
協友(株)長野工場
福島県二本松市平石高田4-286
(株)ニチノーサービス 福島事業所
佐賀県三養基郡上峰町大字堤字二本杉180-1
(株)ニチノーサービス 佐賀事業所

小分製造場 静岡県磐田市塩新田432-3
(株)理研グリーン福田工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和6年12月26日付けをもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テラペンズロンを含む農薬の総使用回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|--------|------|------|------|---------------|---------|------|
| みかん、なつみかん | アゲハ類 | 2000倍 | 200~700 Q/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シロハモリガ | 1000~2000倍 | | 収穫30日前まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| かき | カキハタムシガ | 2000倍 | | 200~700 Q/10a | 収穫前日まで | | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イガ類 | 2000倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| もも | モモハモリガ、シクイムシ類 | 1000~2000倍 | | | | | | | 200~700 Q/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | | | | |
| | 初刈ア | 2000倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| りんご | キンモンホリガ | 2000~6000倍 | | | | | | | | | | | 200~700 Q/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | |
| | キンモンハモリガ | 4000倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヒメシロモドキガ、シクイムシ類 | 2000倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なし | ヨモギエダシヤク | 2000~4000倍 | | | | | | | | | | | | | | | 200~700 Q/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | |
| | シクイムシ類 | 1000~2000倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なし | ナシヒガ、ナシホリガ | 2000倍 | 200~700 Q/10a | | | 収穫前日まで | | | | | | | | | | | | | | | 2回以内 | 2回以内 | | |
| | コナガ | 8倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| だいこん | | 16倍 | | 200~700 Q/10a | 収穫21日前まで | | 無人航空機による散布 | 無人航空機による散布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コナガ、アオムシ、ヨウムシ | 2000倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごぼう | ゾウムシ類 | 1000倍 | | | | | | | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | | | | | | | | | | | | |
| 葉ごぼう、えだまめ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | | | | | | | | 100~300 Q/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | | | |
| | コナヅラミ類 | | | | | | | | | | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | | | | | | | | | | | |
| とうがん | コナヅラミ類 | | | | | | | | | | 2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | |
| はくさい | カキハタムシ、コナガ、アオムシ、ヨウムシ | | | | | | | | | | | | 100~300 Q/10a | | | 100~300 Q/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | |
| | トマト、ミニトマト、なす | | | | | | | | | | | | | | | | ハスモンヨトウ、コナヅラミ類 | | | | | | | |
| さやえんどう | シイチモンヨトウ | | 2000倍 | | | 100~300 Q/10a | | | | | | | | | | | 収穫前日まで | | | 2回以内 | 2回以内 | | | |
| キャベツ | コナガ、アオムシ、ヨウムシ、タナキソウリガ、ハスモンヨトウ | | | | | | | | | | | | | | | | 100~300 Q/10a | | | | | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 |
| | コナガ | | | 16倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ねぎ | シイチモンヨトウ | | | 2000倍 | 100~300 Q/10a | | 収穫7日前まで | 2回以内 | | | | | | | | | | | | | | | 2回以内 | |
| ブロッコリー | コナガ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 茎ブロッコリー | アオムシ | 収穫3日前まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なばな | コナガ | 2000倍 | | | | | 100~300 Q/10a | | 収穫7日前まで | 1回 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | チゲンサイ、たかな | 収穫14日前まで | | | | | | | | | | | | | | |
| ほうれんそう | ヨウムシ | | | | | | | | 2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | | | | | | | | | | |
| きく(葉) | ヨウムシ類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いちご、アスパラガス | | | 収穫前日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| しょうが | ハスモンヨトウ | | 25倍 | | | 3.2 Q/10a | | | | | 収穫7日前まで | | | 無人航空機による散布 | 無人航空機による散布 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 登録農薬を含む農薬の総使用回数 |
|----------|----------------------------------|--------------|-----------------|----------|---------|----------------------|-----------------|
| ワス | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100～300 Q / 10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 無人航空機による散布 | 2回以内 |
| 非結球ワス | | | | 収穫30日前まで | | | |
| だいず | | 8～16倍 | 0.8 Q / 10a | 収穫14日前まで | | | |
| てんさい | ヨトウムシ | 1000～2000倍 | 100～300 Q / 10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | | |
| かんしょ | ハスモンヨトウ ナシノコシバ、ハイロサビヒョウタンゾウムシ | | | | | | |
| 茶 | ヨモギ、エダシヤク、チャノホソガ | 2000～4000倍 | 200～400 Q / 10a | 摘採7日前まで | 1回 | | 1回 |
| ストク | コナガ、アオムシ | 2000倍 | 100～300 Q / 10a | 発生初期 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| りんどう | リントウホソハマキ | 1000倍 | | | | | |
| はばたん | コナガ | 2000倍 | | | | | |
| けいとう | シロヒメノメイガ | | | | | | |
| 花き類・観葉植物 | ヨトウムシ類 | | | | | | |
| ホインセチ | コナガラミ類 | | | | | | |
| からまつ、こなら | マイマイガ | 20000～30000倍 | 200～700 Q / 10a | - | | | |
| さくら、ブラタス | アメリカシロヒトリ | | | | | | |