

農薬登録票

登録番号 第 16130 号

登録年月日 平成30年 9月 24日

農薬の種類 ベンタゾン液剤

農薬の名称 クミアイバサグラン液剤（ナトリウム塩）

物理的
化学的性質 赤色澄明水溶性液体

有効成分の種類及び含有量 3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジアゾリン(4)-2,2-ジメチルナトリウム塩 40.0%

その他の成分の種類及び含有量 水 60.0%

適用病害虫及び
使用範囲及び
使用方法 (別記1のとおり)

製造者又は
輸入者の
氏名及び住所 東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

製造場の
名称及び所在地 兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンゾアソンを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稻	一年生雑草(イ科を除く)、マツバ、イ、ホ タルイ、ウリカ、オモダカ、ミス、カヤツリ、ヘラオモダ カ、クログワイ、ウリキヤ、テ、エソノサヤヌカ、サ、シ ズ、イ、クサネム	移植後15日～収穫45 日前まで	500～700mL /10a		2回以内	落水散布又はごく 浅く湛水して 散布	2回以内
直播水稻	一年生雑草(イ科を除く)、マツバ、イ、ホ タルイ、ウリカ、オモダカ、ミス、カヤツリ、ヘラオモダ カ、クログワイ	は種後35日～収穫45 日前まで					
たまねぎ	一年生雑草(イ科を除く)	春播栽培の移植後6月 上旬まで 但し 収穫 30日前まで	60～120mL /10a	70～100 L /10a	1回	雑草茎葉散布又 は全面散布	1回
らっきょう		秋播栽培の移植後生 葉4葉期まで 但し 収 穫30日前まで	100～200mL /10a				
いんげんまめ		出芽後 但し 収穫60 日前まで	50～70mL /10a				
えんどうまめ		初生葉展開期～本葉 抽出始期	100～200mL /10a				
実えんどう、さ やえんどう		3～6葉期 但し 収穫 70日前まで	100～200mL /10a				
とうもろこし		3～6葉期 但し 収穫 40日前まで	100～150mL /10a				
飼料用とうもろ こし		生育期 但し 収穫50 日前まで	100～200mL /10a				
ソルガム		生育期 但し 収穫30 日前まで	100～200mL /10a				
麦類(小麦を除 く)		生育期 但し 収穫90 日前まで	150mL/10a				
小麦		生育期 但し 収穫45 日前まで	100～200mL /10a				
はとむぎ		親株養成期 植付45～ 60日後まで	200mL/10a				
べにばないんげ ん		生育期 但し 収穫30 日前まで	100 L /10a				
せり							
おうぎ							