

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 14685 号

登 録 年 月 日 平成29年 8月 7日

農 薬 の 種 類 メプロニル水和剤

農 薬 の 名 称 バシタック水和剤 7 5

物 理 的 類白色水和性粉末 63 μ m以下
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の 3'-イソプロピルキニ-2-メチルペンソアミド 75.0%
種 類 及 び 含 有 量

そ の 他 の 鉍物質微粉、界面活性剤等 25.0%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 広島県尾道市長者原2-160
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業(株)尾道工場
宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
クミアイ化学工業(株)小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	12.1ロルを含む農薬の総使用回数
稲	紋枯病	1000～1500倍	60～150 Q /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	疑似紋枯症(赤色菌核病菌)、疑似紋枯症(褐色菌核病菌)、疑似紋枯症(褐色紋枯病菌)	1000倍					
麦類	雪腐小粒菌核病	750～1500倍		根雪前	2回以内		3回以内(根雪前は2回以内、融雪後は2回以内)
	さび病	1000～1500倍	収穫30日前まで				
てんさい	根腐病、葉腐病	500倍	100～300 Q /10a	収穫21日前まで	6回以内		6回以内
	葉腐病	125倍	25 Q /10a				
ばれいしょ	黒あざ病	70～100倍		植付前又は貯蔵前	1回	5～20秒間種いも浸漬	1回
ふき	白絹病	1000～1500倍	2～3 Q /㎡	定植時	2回以内	土壌灌注	2回以内
ふき(ふきのとう)				収穫120日前まで			
だいこん	苗立枯病(リゾクトニア菌)	種子重量の0.4%	-	は種前	1回	種子粉衣	3回以内(種子粉衣は1回以内)
	亀裂褐変症(リゾクトニア菌)	1000～1500倍	100～300 Q /10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	
トマト、ミニトマト、きゅうり、すいか	苗立枯病(リゾクトニア菌)	種子重量の0.4%	-	は種前	1回	種子粉衣	2回以内(種子への処理は1回以内、土壌灌注は1回以内)
		750～1500倍	3 Q /㎡	は種時～子葉展開時		土壌灌注	
種子重量の0.4%		-	は種前	種子粉衣			
200倍				1時間種子浸漬			
1000倍				24時間種子浸漬			
ほうれんそう		750～1500倍	3 Q /㎡	は種時～子葉展開時		土壌灌注	
レタス	すそ枯病	500～1000倍	100～300 Q /10a	結球開始期まで、ただし収穫30日前まで	3回以内	散布	4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)
ぶどう	さび病	1000倍		収穫45日前まで	1回		1回
なし	赤星病	500～1000倍	200～700 Q /10a	収穫60日前まで	5回以内		5回以内
びゃくしん類				冬孢子堆膨潤前	3回以内		3回以内
きく	白さび病		100～300 Q /10a	発病初期	5回以内	5回以内	
カーネーション	さび病				8回以内	8回以内	
たばこ	腰折病	1000～2000倍	3 Q /㎡	苗床期	2回以内	土壌灌注	2回以内
つつじ類	もち病	1000倍	200～700 Q /10a	発病初期	8回以内	散布	8回以内
やなぎ	さび病				3回以内		
樹木類	くもの巣病					3回以内	土壌灌注
	白絹病		3 Q /㎡				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	7-エチを含む農薬の総使用回数
せいようきんしばい	さび病	1000倍	200～700 Q /10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内
芝(日本芝)	葉腐病(フジバチ)とさび病	500～1000倍	1～2 Q /㎡		8回以内		8回以内
芝(ペンタグラス)	葉腐病(フジバチ) 雪腐小粒菌核病				根雪前		

(別記1)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マニピュレーションを含む農薬の総使用回数
野菜類、豆類(種実)	リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等)	乾燥種子重量の0.4%	は種前	1回	種子処理機による種子粉衣	1回
飼料作物	黒穂病				種子粉衣	種子処理機による種子粉衣
ねぎ						
花き類						