

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 14391 号

登 録 年 月 日 平成28年 12月 6日

農 薬 の 種 類 ベンジルアミノプリン液剤

農 薬 の 名 称 ビーエー液剤

物 理 的 淡黄色澄明水溶性液体
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の 6-(N-ベンジルアミノ)プリン 3.0%
種 類 及 び 含 有 量

そ の 他 の 界面活性剤、有機溶剤等 97.0%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 静岡県磐田市塩新田432-3
名 称 及 び 所 在 地 株理研グリーン福田工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用場所	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数			
りんご(苗木)		側芽発生促進	50～100倍	5～10mL/苗木	新梢伸長時	10回以内	新たに伸長した新梢部に散布	10回以内(立木全面散布は1回以内)			
りんご		高接1年枝側芽発生促進		100～400 L/10a		伸長旺盛期(6月上旬以降)	立木全面散布				
なし(栽培育成時の非収穫年樹)		側芽発生促進	30倍	3mL/側芽	側芽発生時			発芽部位に噴霧			
ぶどう(デラウェア)	露地栽培園	無種子化処理の第1回ジベレリン処理時期の早期への拡大	300倍		満開予定日の14～17日前	1回	ジベレリン処理の第1回処理液に添加して蕾(果房)を浸漬処理する。	1回			
	ハウス栽培の花振り発生園										
ぶどう(マスカット・ベリーA、旅路(紅塩谷)、ハッファロー(アールスメーン))	露地栽培の花振り発生園								花振り防止		満開予定日の11～14日前
	ハウス等施設栽培の花振り発生園										
温州みかん	露地栽培・加温ハウス栽培園	新梢発生促進	100～200倍	200～700 L/10a	萌芽直前～萌芽期(加温ハウス栽培園では収穫後)	1回	緑枝部へ散布	2回以内(萌芽直前～萌芽期(加温ハウス栽培園では収穫後)は1回以内、早期加温ハウス栽培園での加温直後は1回以内)			
	早期加温ハウス栽培園	着花促進	100～400倍		加温直後		散布				
おうとう(苗木)		副梢発生促進	25～50倍	200～800mL/苗木	新梢伸長時(主幹延長枝の30～80cm伸長期)	6回以内	立木全面散布	1回			
アスパラガス		萌芽促進	300～600倍	100～300 L/10a	夏秋どり、慣行最終収穫予定日の10～30日前(但し、収穫前日まで)		茎葉散布				
きく		親株栽培における側枝への腋芽の着生促進	2000～4000倍		摘心時			2回以内	5回以内		
カーネーション		側芽発生促進	300倍	6mL/株	側芽発生前					2回以内	
こちょうらん		着蕾数増加	1000倍	0.5mL/花茎	発蕾時		5回以内	花茎の先端部に噴霧	5回以内		