

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 18848 号

登 録 年 月 日 平成30年 11月 28日

農 薬 の 種 類 マンゼブ水和剤

農 薬 の 名 称 クミアイペンコゼブフロアブル

物 理 的 性 状 黄色水和性粘稠懸濁液体
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の 種 類 及び 含 有 量 亜鉛イオン配位マンガニースエチレンビスジチオホーメート 28.0%

そ の 他 の 種 類 及び 含 有 量 水、界面活性剤等 72.0%

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業(株)小牛田工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり、
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マシエを含む農薬の総使用回数
ぶどう	べと病、黒とう病、晚腐病、褐斑病	1000倍	200～700 Q/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
うめ	黒星病、かいよう病、すす斑病			収穫21日前まで			
きゅうり	べと病、炭疽病	500～1000倍	150～300 Q/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
	褐斑病	500倍					
トマト、ミニトマト	疫病、葉かび病、輪紋病、すすかび病	1000倍		2回以内	2回以内		
メロン	べと病	500～600倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
	つる枯病	500倍			7回以内		7回以内
すいか	つる枯病、炭疽病	600倍					
キャベツ	べと病	500～600倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
ねぎ	黒斑病、さび病、べと病			収穫14日前まで			
さやえんどう	褐紋病、褐斑病	500倍	100～300 Q/10a	収穫開始30日前まで	2回以内		2回以内
実えんどう				収穫14日前まで			
きく	白さび病	800倍		発病前～発病初期	8回以内		8回以内