

# 農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 14640 号

登 録 年 月 日 平成29年 6月 29日

農 薬 の 種 類 ダイアジノン・メソミル粒剤

農 薬 の 名 称 ランダイヤ粒剤

物 理 的 灰褐色細粒  
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の (2-イソプロピル-4-メチル-6-ジエチルホスフェート) ..... 3.0%  
種 類 及 び 含 有 量 S-メチル-N-[(メチルカルバモイル)オキシ]チオアセトイミド ..... 1.0%

そ の 他 の 鉍物質、界面活性剤等 ..... 96.0%  
成 分 の 種 類 及 び 含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)  
の 範 囲 及 び 使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号  
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社  
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 広島県尾道市長者原2-160  
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業(株)尾道工場  
宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100  
クミアイ化学工業(株)小牛田工場  
兵庫県たつの市揖保町山下555  
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり  
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

## (別記1)

| 作物名    | 適用病害虫名                         | 使用量        | 使用時期                      | 本剤の使用回数 | 使用方法                  | ダイズノを含む農薬の総使用回数                                      | ノミミを含む農薬の総使用回数      |
|--------|--------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| はくさい   | ネリムシ類                          | 4～6kg/10a  | は種時                       | 1回      | 作条土壌混和                | 1回                                                   | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内) |
| キャベツ   |                                |            | は種時、定植時及び生育初期 但し、収穫30日前まで | 2回以内    |                       | 2回以内                                                 | 3回以内                |
| レタス    |                                |            | 植付時                       | 1回      |                       |                                                      | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内) |
| リーフレタス |                                | 6kg/10a    |                           |         |                       |                                                      | 1回                  |
| だいこん   | ネリムシ類、キヌネノミムシ                  | 4～6kg/10a  | は種時                       |         |                       | 2回以内(生育期は1回以内)                                       | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内) |
| かんしょ   | コガネムシ類幼虫                       | 6～9kg/10a  | 植付時及び生育期、但し、収穫30日前まで      | 3回以内    | 植付時:作条処理土壌混和 生育期:作条処理 | 3回以内(マイカブセル剤の植付前の処理は1回以内、マイカブセル剤の散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内) | 5回以内                |
|        | アリガネムシ類                        | 9kg/10a    | 植付時 但し、収穫30日前まで           | 1回      | 作条処理土壌混和              |                                                      |                     |
|        | ハスモンヨトウ、ナガシロシバハ                | 4～6kg/10a  | 収穫30日前まで                  | 2回以内    | 散布                    |                                                      |                     |
| いちご    | コガネムシ類幼虫                       | 6～9kg/10a  | 植付時(仮植床)                  | 1回      | 土壌混和                  | 2回以内                                                 | 4回以内                |
| にんじん   | ネリムシ類、クロハネネコバエ類                | 6kg/10a    | は種前                       |         | 全面処理土壌混和              | 2回以内(は種前及びは種時は合計1回以内、生育期は1回以内)                       | 2回以内(は種前の土壌混和は1回以内) |
| 芝      | スジキリヨトウ、シバノシバハ、コガネムシ類幼虫、シバノシバハ | 6～10kg/10a | 発生初期                      | 4回以内    | 散布                    | 4回以内                                                 | 4回以内                |