

水稲用 初・中期一発処理除草剤

ラオウ®

1キロ粒剤 ジャンボ フロアブル

水田除草の 勝者と 成る。



エフィーダ®
(茎葉白化作用)



フェノキサスルホン®
(ノビエ残効性)



ベンスルフロンメチル
(幅広い草種に対応)



ダイムロン
(カヤツリグサ科の発芽抑制)

4成分で除草を制す。

ノビエ

ホタルイ

オモダカ



- 有効成分：ダイムロン…6.0% (1キロ粒剤)、24.0% (ジャンボ)、11.3% (フロアブル)
フェノキサスルホン…1.5% (1キロ粒剤)、6.0% (ジャンボ)、2.8% (フロアブル)
フェンキノトリオン…2.5% (1キロ粒剤)、10.0% (ジャンボ)、4.7% (フロアブル)
ペンシルフロメチル…0.75% (1キロ粒剤)、3.0% (ジャンボ)、1.4% (フロアブル)
- 人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指すという通称)

特 長

- 有効成分「エフィーダ® (一般名：フェンキノトリオン)」を配合した4成分の混合剤です。
- エフィーダ配合により水稲安全性が高く、広葉雑草に幅広く効果を示し、特にホタルイなどのカヤツリグサ科雑草に高い効果を発揮します。
- ペンシルフロメチル配合により多年生難防除草草に高い効果を示します。
- フェノキサスルホン配合によりノビエに優れた除草効果と長期残効性を示します。

適用雑草及び使用方法

2025年9月現在の登録内容

※各有効成分を含む農薬の総使用回数：ダイムロン3回以内(移植水稲・育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)・2回以内(直播水稲)、フェノキサスルホン2回以内、フェンキノトリオン2回以内、ペンシルフロメチル2回以内

1キロ粒剤(農林水産省登録 第24579号)

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1 kg	1回※	田植同時散布機で施用
		移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで			湛水散布 又は、 無人航空機による散布
直播水稲	一年生雑草及びマツバイ ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			


ジャンボ(農林水産省登録 第24580号)

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草 多年生広葉雑草	移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (250g)	1回※	水田に小包装(パック) のまま投げ入れる。
		稲1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			
直播水稲	一年生雑草及びホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ				

フロアブル(農林水産省登録 第24581号)

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草 多年生広葉雑草	移植時	500ml	1回※	田植同時散布機で施用
		移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで			原液湛水散布、水口施用 又は無人航空機による滴下
直播水稲	一年生雑草及びマツバイ ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			原液湛水散布 又は無人航空機による滴下

上手な使い方



詳しい使い方、
登録内容とSDSは
こちらから。

1キロ粒剤



ジャンボ



フロアブル



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌を記載しましょう。

本資料は2025年9月現在の知見に基づき作成しています。 2542(25-9)