

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 24388 号

登 録 年 月 日 令和2年 5月 13日

農 薬 の 種 類 フロルピラウキシフェンベンジル乳剤

農 薬 の 名 称 クミアイロイヤント乳剤

農 薬 の 物 理 的
化 学 的 性 状 黄色可乳化油状液体

農薬の有効成分の
種類及び含有濃度 ベンジル=4-アミノ-3-クロロ-6-(4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニル)-5-フルオロピリジソン-2-カルボキシレート
..... 2.7%

農 薬 の そ の 他 の
成 分 の 種 類 及 び
含 有 濃 度 界面活性剤、有機溶剤等 97.3%

農薬の適用病害虫
の 範 囲 及 び
使 用 方 法 (別記1のとおり)

農薬の製造者又は
輸 入 者 の
氏 名 及 び 住 所 東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

農 薬 の 製 造 場 の
名 称 及 び 所 在 地 米国 アリゾナ州 デモイ バンダリアポート 3525
ペナ インダストリーズ社 デモイ工場

農薬の小分製造場 兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬原体の有効成分
以 外 の 成 分 の
種 類 及 び 含 有 濃 度 (別記2のとおり)

令和 7年 9月 10日 付けをもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ラネックス・ベンゾルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稻	一年生広葉雑草、ノヒエ、ミズカヤツリ、ウリカ、セリ	移植後20日～ノヒエ5葉期 ただし、収穫45日前まで	200mQ/10a	25～100 Q /10a	2回以内	落水散布、ごく浅く湛水して散布又は湛水散布	3回以内
	ノヒエ、オモクサ、エゾノササカ、ササ、イナガエツルノケイトウ			落水散布又はごく浅く湛水して散布			
直播水稻	一年生広葉雑草、ノヒエ、ミズカヤツリ、ウリカ、セリ、オオクサヒ	稲3葉期～ノヒエ5葉期 ただし、収穫45日前まで				100 Q /10a	

(別記1)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	カサ・カサシ・ペンシルを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水稻(水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び多年生広葉雑草	収穫45日前まで(雑草生育期)	200mL/10a	125～100 L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内

(別記2)

70ルピ[®]ラキシフェンゾ[®]ル原体

有効成分以外の成分の総量

(70ルピ[®]ラキシフェンゾ[®]ル

トルエン

90g/kg以下

910g/kg以上)

2g/kg以下