

新規作用性 殺虫剤



ファインセーブ®

フロアブル

アザミウマ類に特効的・サビダニ類にも高い効果

併せて、タバココナジラミ類、小型のチョウ目害虫にも有効

新規作用機作で既存剤に感受性の低下した害虫に有効

ミトコンドリア電子伝達系複合体III Qiを阻害する

天敵・有用昆虫に対する影響が小さい

ミツバチ・マルハナバチ・カブリダニ類等に対して影響が小さい

極めて高い速効性・優れた残効性



250ml入り

500ml入り



自然に学び自然を守る



ファインセーブは登録商標第5543984号



有効成分：フロメトキン……………10.0%
その他成分：水、界面活性剤等……………90.0%
性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
毒性：医薬用外劇物

適用害虫の範囲及び使用方法

「散布」で使用する場合

2025年9月現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロメトキンを含む農薬の総使用回数			
かんきつ	アザミウマ類、ミカンサビダニ、チャノホコリダニ	2000～4000倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内			
もも、マンゴー	アザミウマ類	2000倍		収穫前日まで				2回以内	2回以内	
ぶどう	アザミウマ類、ブドウサビダニ	1000倍								3回以内
なす	タバココナジラミ類 ※①	1000～2000倍	2回以内		2回以内					
しょくようほおずき、未成熟そらまめ さやいんげん、しそ(花穂)、 バジル、にんにく	アザミウマ類	2000倍					3回以内	3回以内		
		2000倍							3回以内	3回以内
トマト、ミニトマト	アザミウマ類、タバココナジラミ類 ※①	1000～2000倍	100～300ℓ/10a		収穫7日前まで					
ししとう、ピーマン	トマトサビダニ	1000～4000倍					2回以内	2回以内		
	タバココナジラミ類 ※①	1000倍							3回以内	3回以内
すいか、いちご	アザミウマ類	1000～2000倍	100～300ℓ/10a		収穫7日前まで	2回以内				
こまつな	コナガ、アザミウマ類	2000倍		2回以内			2回以内			
非結球あぶらな科葉菜類(こまつなを除く)	コナガ	1000倍						3回以内	3回以内	
はくさい	アオムシ	1000～2000倍	2回以内		2回以内					
キャベツ	コナガ、アザミウマ類	1000倍		2回以内		2回以内				
	アオムシ	2000倍					2回以内	2回以内		
レタス	アザミウマ類	2000倍	収穫3日前まで		3回以内				散布、但し※②	3回以内
きく(葉)、にら、食用ぎく				1000倍		3回以内				
しそ							1000倍	3回以内		
みょうが(花穂)		1000倍	3回以内		3回以内					
みょうが(莖葉)				1000倍		3回以内			3回以内	
ブロッコリー、カリフラワー	アオムシ、アザミウマ類						1000～2000倍	2回以内		2回以内
だいこん	コナガ	2回以内	2回以内							
ねぎ	アザミウマ類			2000倍	2回以内					
わけぎ、あさつき	ネギハモグリバエ					2000倍	2回以内			
	アザミウマ類、ネギハモグリバエ	2000倍	2回以内							
たまねぎ	アザミウマ類			1000～2000倍	100～800ℓ/10a			収穫3日前まで	3回以内	3回以内
ほうれんそう						2000倍	100～800ℓ/10a			
アスパラガス	アザミウマ類、タバココナジラミ類 ※①	2000倍	100～800ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		2回以内		
茶	チャノホソガ	2000～4000倍	200～400ℓ/10a	摘採7日前まで			2回以内		2回以内	
	チャノキイロアザミウマ	1000～4000倍								100～300ℓ/10a
きく、ほおずき、トルコギキョウ	アザミウマ類	2000倍	100～300ℓ/10a	発生初期	2回以内	2回以内				
グロリオサ、ダリア、ランタンキュラス		1000倍								

※① シルバーリーフコナジラミを含む ※② 花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。

※③ みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで

「常温煙霧」で使用する場合

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロメトキンを含む農薬の総使用回数
なす	温室、ガラス室、 ビニールハウス等の 密閉できる場所	アザミウマ類	67倍	10ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	常温煙霧	3回以内
みょうが(花穂)			33倍				常温煙霧、但し※④	
みょうが(莖葉)							常温煙霧	

※③ みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで

※④ 花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により煙霧が直接花穂に飛散しない状態で使用する。

使い方のポイント

- 使用する前に容器を良く振ってください。
- 抵抗性の発達を抑えるため、連用はさけてください。
- 散布ムラがないように散布してください。
- 濡れ性のよい展着剤の加用をおすすめします。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届くところには置かないでください。 ● 空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。 ● 防除日誌に記帳しましょう。

この印刷物は2025年9月現在の登録に準拠して作成しました。

自然に学び 自然を守る

クミアイ化学工業株式会社本社:東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL03-3822-5036
ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>

2544(25-9)

DPFSFL044Y2509T8000

JAグループ
農 協 | 全 農 | 経済連

全 協 は登録商標 第4702318号