

農林水産省登録
第23102号

果樹の病害防除の定番に！！

攻守に優れた
ミラクルアシスト！！

殺菌剤

ファンタジスタ®

顆粒水和剤

©はクミアイ化学工業（株）の登録商標



ぶどうの褐斑病、
キウイフルーツの
果実軟腐病に
適用拡大！





詳しい使い方、登録内容とSDSはこちらから

有効成分：ピリベンカルブ……………40.0%

殺菌剤分類 **11**

人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)



特設サイト



果樹の病害防除の定番に!!

特長


- 系統名ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。

適用病害と使用方法 (抜粋) ■ が適用拡大部分

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、モニリア病、褐斑病、斑点落葉病、すす点病、黒点病、輪紋病	3000~4000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
おうとう	灰星病、幼果菌核病、褐色せん孔病、黒斑病	3000倍					
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病、心腐れ症(胴枯病菌)	3000~4000倍					
かき	炭疽病、褐色斑点病	3000倍					
ぶどう	灰色かび病、落葉病、うどんこ病、炭疽病	3000~4000倍					
もも	灰色かび病、晩腐病、黒とう病	3000倍					
ネクタリン	さび病、うどんこ病、褐斑病	3000倍					
キウイフルーツ	うどんこ病	3000~4000倍					
かんきつ	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病	4000倍					
ブルーベリー	すす斑病、灰色かび病、果実軟腐病	2000~4000倍					
小粒核果類(うめを除く)	灰色かび病、そうか病、黒点病	2000倍					
うめ	炭疽病(さび果)	2000倍					
	灰色かび病	4000倍					
	灰星病、黒星病	3000倍					
	灰色かび病、すす斑病、灰星病、黒星病	3000倍					


試験事例

● うめの黒星病に対する防除効果



- 試験年度/2008年
- 試験場所/福井県植物防疫協会
- 品 種/紅サシ
- 発生状況/基発生(無処理発病度: 83.8)
- 区制・面積/1区3樹 3反復
- 散布日/4月9日(展葉初期)、4月20日、5月2日
- 調査日/6月12日
- 調査方法/各区100果について発病果数を調査し、防除値を算出した。

● かんきつの灰色かび病に対する防除効果



- 試験年度/2002年
- 試験場所/和歌山県農林水産総合技術センター
- 品 種/興津早生
- 発生状況/中発生(無処理発病度: 14.3)
- 区制・面積/1区3樹
- 散布日/5月2日(満開期)
- 調査日/5月29日
- 調査方法/1樹100果について発病果数を調査し、防除値を算出した。

使用上の注意事項 (抜粋)

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の担当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2026年1月現在の登録内容に基づいています。



JAグループ
農 協 **全 農** 経 済 連
E11 は登録商標第4702318号

製造販売



自然に学び 自然を守る

クミアイ化学工業株式会社

本社: 東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL.03-3822-5036
ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>