

野菜の病害防除の定番に!!

攻守に優れた
ミラクルアシスト!!

殺菌剤

ファンタゾスタ®

顆粒水和剤

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標



殺菌剤の
オールラウンド
プレイヤー



殺菌剤

ファンタジスタ®

顆粒水和剤

●詳しい使い方、登録内容とSDSはこちらから



有効成分：ピリベンカルブ…40.0% 殺菌剤分類 11
人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特設サイト



使用上の注意事項

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- なすに使用する場合、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- さやえんどうに使用する場合、高温や多湿条件下では、葉や莢に薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- トマトの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、散布後十分に換気をおこなってください。
- 無人航空機で散布する場合は次の注意を守ってください。
 - ・散布は散布機種ごとの散布基準に従って実施してください。
 - ・散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ・散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - ・散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域の諸物件に十分留意してください。
 - ・散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
- ハウス等の常温煙霧に使用する場合は、次のことに注意してください。
 - ・専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当っては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
 - ・できるだけ日中の煙霧はさけ、夕刻から煙霧し、6時間以上密閉状態としてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑にはからさないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物または新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。尚、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗顔してください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷凍・乾燥した場所に保管してください。

特長

- 系統名ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 野菜類の菌核病や灰色かび病に高い防除効果を示します。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。

適用病害と使用方法(抜粋) 〇が適用拡大部分

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病、菌核病	2000~3000倍	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
トマト	菌核病、すすかび病、灰色かび病、葉かび病、斑点病						
ミニトマト	立枯病	2000倍					
なす	うどんこ病、褐色円星病、褐紋病、すすかび病、フザリウム立枯病	2000~3000倍					
	褐色斑点病、菌核病、黒枯病、灰色かび病	2000倍					
いちご	炭疽病	2000~3000倍					
	灰色かび病	100倍	10L/10a			常温煙霧	
キャベツ	株腐病、黒斑病、根朽病	2000倍					
	菌核病、灰色かび病	2000~3000倍		収穫3日前まで			
レタス	菌核病、灰色かび病	2000~3000倍					
	すそ枯病	2000倍					
非結球レタス	菌核病、灰色かび病	2000~3000倍		収穫14日前まで		散布	
	すそ枯病	2000倍					
たまねぎ	灰色かび病、小菌核病	2000~4000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内
	灰色腐敗病	2000~3000倍					(但し、定植前は1回以内)
		1000~2000倍	—	定植直前	1回	5分間根幹部浸漬 5分間セル苗浸漬	
にんじん	うどんこ病、菌核病、黒葉枯病、斑点病	3000倍	100~300ℓ /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
にんにく	黄斑病、さび病、葉枯病、白斑葉枯病			収穫7日前まで			
にら	褐色葉枯病、さび病、白斑葉枯病			収穫前日まで			
ねぎ	黒腐菌核病、黒斑病、さび病、白絹病、葉枯病、小菌核腐敗病、小菌核病			収穫21日前まで	2回以内	株元灌注	5回以内
	黒腐菌核病、白絹病	1000倍	1L/平方メートル				(但し、株元灌注は2回以内、散布は3回以内)
えんどうまめ	菌核病、さび病、灰色かび病	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで		散布	
	菌核病、灰色かび病	32~64倍	3.2L/10a				
		64~128倍	6.4L/10a				
そらまめ	菌核病、さび病、赤色斑点病、灰色かび病	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで		散布	
	菌核病、灰色かび病	32~64倍	3.2L/10a				
		64~128倍	6.4L/10a				
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病、灰色かび病	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布	
		32~64倍	3.2L/10a				
		64~128倍	6.4L/10a				
えだまめ	紫斑病	2000~4000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	菌核病、炭疽病、灰色かび病	2000倍					
さやいんげん	菌核病、灰色かび病	32~64倍	3.2L/10a	収穫前日まで		無人航空機による散布	
		64~128倍	6.4L/10a				
さやえんどう	菌核病、さび病、灰色かび病	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで		散布	
	菌核病、灰色かび病	32~64倍	3.2L/10a				
		64~128倍	6.4L/10a				
未成熟そらまめ	菌核病、さび病、赤色斑点病、灰色かび病	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで		無人航空機による散布	
	菌核病、灰色かび病	32~64倍	3.2L/10a				
		64~128倍	6.4L/10a				
ピーマン	黒枯病、斑点病	4000倍		収穫3日前まで		散布	
はなやさい類	菌核病、黒すす病						
はくさい	菌核病、黒斑病、炭疽病、白斑病	3000倍	100~300ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内
しそ	斑点病						3回以内
アスパラガス	褐斑病、茎枯病、斑点病			収穫前日まで		散布	
くきちや	灰色かび病						
オクラ	うどんこ病、灰色かび病、葉すす病	2000倍	100~300ℓ/10a		3回以内		3回以内

上記のほか、りんご、おうとう、もも、茶、豆類などの作物に登録があります。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2026年1月現在の登録内容に基づいています。



JAグループ

農協 全農 経済連

登録商標 第4702318号

製造販売



自然に学び 自然を守る

クミアイ化学工業株式会社

本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL.03-3822-5036
ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>