

We are fine, ナエファイン

1成分で3種類のイネ苗立枯病菌
(ピシウム、フザリウム、リゾープス)を同時防除。



WCS※用
イネに
使用できます。

※WCS:稲発酵粗飼料

イネ苗立枯病防除剤

ナエファイン® フロアブル・粉剤



ピシウム菌



フザリウム菌



リゾープス菌



根の生育や移植後の活着を促進します。

©は日本曹達(株)の登録商標

ナエファイン[®]

フロアブル・粉剤

殺菌剤分類 U17

- 有効成分：フロアブル：ピカルプトラゾクス……………10.0%
粉剤：ピカルプトラゾクス……………0.70%
- 人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

- ① 1成分で3種のイネ苗立枯病(ピシウム菌、フザリウム菌、リゾープス菌)に高い防除効果を発揮します。
- ② 根の生育や移植後の活着を促進し、良質な苗作りに貢献します。
- ③ 多様な育苗環境でも、安定した防除効果を発揮します。

適用病害・使用目的と使用方法

2020年12月23日現在

フロアブル	作物名	適用病害名又は使用目的	希釈倍数	使用液量 (育苗箱*1箱当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピカルプトラゾクスを 含む農薬の総使用回数
農林水産省登録 第239550号	稲 (箱育苗)	苗立枯病 (ピシウム菌)	1000~2000倍	0.5ℓ	は種時から緑化期	2回以内	土壌灌注	3回以内 (土壌混和は1回以内) 土壌灌注は2回以内)
			2000倍	0.5~1ℓ				
		苗立枯病 (フザリウム菌) 苗立枯病 (リゾープス菌)	1000倍	0.5ℓ	は種時			
			2000倍	0.5~1ℓ				
ムレ苗防止 根の生育促進、 移植後の活着促進	1000~2000倍	0.5ℓ	は種時から緑化期					
	2000倍	0.5~1ℓ	は種時					

粉剤	作物名	適用病害名又は使用目的	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピカルプトラゾクスを 含む農薬の総使用回数
農林水産省登録 第23954号	稲 (箱育苗)	苗立枯病(ピシウム菌) 苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(リゾープス菌)	育苗箱* 1箱当り6~8g	は種前	1回	育苗箱土壌に 均一に混和する	3回以内 (土壌混和は1回以内) 土壌灌注は2回以内)
		ムレ苗防止 根の生育促進、移植後の活着促進					

※30×60×3cm、使用土壌約5ℓ

試験成績

●苗立枯病(ピシウム菌) 粉剤


2013年 岩手県農業研究センター



発生状況：中発生(接種)
品種：ひとめぼれ
播種：6月28日
区制：1区 1/10育苗箱大プラスチックケース、3反復
処理日：6月28日(播種当日)
処理方法：床土混和
調査方法：7月12日(播種14日後/2.0葉期)に発病程度別に発病苗数を調査した。

●苗立枯病(フザリウム菌) フロアブル


2013年 北海道植物防疫協会



発生状況：甚(接種)
品種：ななつぼし 中苗
播種：5月9日
区制：1区 1/10育苗箱、3反復
処理日：5月9日(播種後覆土前灌注)
調査方法：6月1日(播種23日後)に各区200苗について発病指数別に発病苗数を調査した。

●苗立枯病(リゾープス菌) フロアブル

2012年 秋田県立大



発生状況：少発生(接種)
品種：あきたごまち
播種：7月3日
区制：1区 1/10育苗箱大プラスチックカップ、3反復
処理日：7月3日(播種時覆土前灌注)
調査方法：7月23日(播種20日後)に全苗について発病程度別に発病苗数を調査した。

⚠️ 効果・薬害等の注意

- 【共通】
- ムレ苗防止に使用する場合、ピシウム菌によるムレ苗に有効ですので、このようなムレ苗の発生する地域で使用してください。
 - 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 【フロアブル】
- 使用前によく振ってから使用してください。
 - 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 【粉剤】
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
 - なるべく播種直前に土壌に混和してください。

⚠️ 安全使用上の注意

- 【フロアブル】
- 誤飲などのないよう注意してください。
 - 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 【粉剤】
- 誤食などのないよう注意してください。
 - 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - 使用の際は農薬用マスクなどを着用してください。作業後は洗眼・うがいをしてください。

詳しい使い方、登録内容、SDSはこちらから。

特設サイト



フロアブル



粉剤



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌を記載しましょう。

本資料は2020年12月23日現在の知見に基づき作成しています。

2592(26-3)