

各位

全3ページ
登録速報(2026-096)
2026年7月22日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記のとおりフェリムゾンの再評価が終了になりましたので、ご連絡します。
適用拡大登録年月日：2026年7月22日

記

1. 農薬の登録番号、種類及び名称

登録番号 第24347号

種類：ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド粉剤

名称：ブレードスタークル粉剤DL

2. 農薬の物理的・化学的性状

類白色粉末 45 μ m以下 浮遊性指数 20以下

3. 農薬の有効成分の種類及び含有濃度

(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(4-トリクロロ-3-フルルメチル)ベンゼン	0.35%
(Z)-2'-メチルアセトフェノン-4,6-ジメチルピリミジン-2-イルヒドラゾン	2.0%
4,5,6,7-テトラクロロフライト	1.5%

4. 農薬のその他の成分の種類及び含有濃度（15に掲げる事項を除く。）

鉱物質微粉 等 96.15%

5. 農薬の適用病害虫の範囲、使用方法及び使用期限

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	3～4kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布

ジ・テフランを含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の 総使用回数	アライト®を含む農薬の 総使用回数
4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	2回以内	3回以内

使用期限：4年

6. 農薬の使用上の注意事項（8に掲げる事項を除く。）

- (1) 使用量に合わせ秤量し、使いきることを。
- (2) 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布すること。
- (3) たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- (4) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (5) 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

7. 人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法

(1) 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

イ 蜜蜂に係る注意事項

- ① ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
- ② 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。

(2) 使用に際して講ずべき被害防止方法

ア 農薬使用者に係る被害防止方法

① 防護装備

[散布者]

稲 : 不浸透性手袋

8. 生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨
この登録に係る使用方法では該当がない。

9. 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
通常の使用方法ではその該当がない。

10. 農薬の貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管すること。

以上