クミアイ化学

勝手に広がりカンタンよ♥
殺虫・殺菌効果でイネを守るわ♥

ワイドに
効くって♥



稲こうじ病に
登録拡大




水稲　本田用殺虫殺菌剤

# ワイドパンチ®
## 豆つぶ®

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標












水稲　本田用殺虫殺菌剤

# ワイドパンチ® 豆つぶ®

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標

農林水産省登録
第23386号

| 殺虫剤分類 | 2B | 殺菌剤分類 | 11 |
|---|---|---|---|

●有効成分：エチプロール……24.0%
メトミノストロビン……48.0%
●人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

## 特　長

●エチプロールとメトミノストロビンの混合剤で、斑点米カメムシ類やいもち病等の同時防除が可能です。
●長い残効性を有しているため、安定した効果を示します。
●散布適期が幅広く、使いやすい薬剤です。
●飛散による周辺作物への影響が少ない薬剤です。
●拡散性に優れ、10a当たり250gと軽量で省力的な豆つぶ製剤です。

## 適用病害虫と使用時期


2024年7月現在の登録内容

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メトミノストロビンを含む農薬の総使用回数 | エチプロールを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | いもち病<br>紋枯病<br>穂枯れ(ごま葉枯病菌)<br>墨黒穂病<br>稲こうじ病<br>ウンカ類<br>カメムシ類 | 250g/10a | 収穫35日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 2回以内<br>(は種時(直播)又は移植時までの処理は1回以内) |

## 試験成績

### 穂いもち病に対する防除効果(葉いもち防除あり)


平成24年 秋田県農業試験場




●品種:ナツミノリ
●発生程度:少発生(接種)
●播種日:4月13日
●移植日:5月16日
●出穂日:8月2日
●区制:1区36.9㎡(12.3m×3m)2連制
●処理日:葉いもち防除6月15日(C剤)、穂いもち防除7月23日(出穂10日前)
●調査日:9月4日(出穂33日後)
●調査方法:発病程度別に調査し、防除価を算出した。
●無処理区発病穂率:15.5%

### カメムシ類(アカスジカスミカメ主体)に対する防除効果

平成24年 クミアイ化学工業(株)研究所




●品種:コシヒカリ
●発生程度:アカスジカスミカメ(少発生)、ミナミアオカメムシ(極少発生)
●移植日:5月17日
●出穂日:8月2日
●区制:1区59.5㎡(8.5m×7m)3連制
●処理日:7月28日(出穂5日前)
●調査方法:収穫期に各区200穂を抜き取り、乾燥・脱穀・もみすり後、粗玄米全粒中の斑点米数を調査した。

## ⚠ 効果・薬害等の注意

●使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
●使用する場合には、湛水状態(3~5cm程度)で田面に均一に散布し、4~5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないでください。
●藻類などの水面浮遊物が多い場合は、拡散が不十分になるおそれがあるため、周縁部散布をさけ、本田内で水田全面に散布してください。
●吸湿性があるので、濡れた手で作業したり、降雨で濡れたりすることがないように注意してください。また、開封後は早めに使用してください。
●本剤の使用により、稲の葉に褐点を生じる場合があるので、所定の使用量を厳守してください。特に急激な温度上昇が起こる気象条件(フェーン現象等)では注意してください。
●穂いもちの防除を目的とする場合、その散布時期は出穂10~20日前が望ましいです。
●蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにしてください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
○ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
○関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
●散布に使用した器具、容器の洗浄水および空袋などは河川などに流さず、容器、空袋は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
●使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

## ⚠ 安全使用上の注意

カブレ

●本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

**魚毒性等**:水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
**保管**:密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼・乾燥した場所に保管してください。

詳しい使い方、登録内容はこちらから。　豆つぶ250

●使用前にはラベルをよく読んでください。　●ラベルの記載以外には使用しないでください。　●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。　●防除日誌を記帳しましょう。

2641(26-11)

JAグループ 農協 全農 経済連
全農 は登録商標　第4702318号

クミアイ化学

会社情報