

多彩な作物の、多様な害虫をノックダウン！
守ってきた、実りがある。

ミツバチ
にも
安心です！



合成ピレスロイド系 殺虫・殺ダニ剤

マブリック®
水和剤20



- 速効的に殺虫効果を発揮する、合成ピレスロイド系殺虫剤。
- 果樹・野菜・茶・畑作物・花きなど、多彩な作物に登録。
- ミツバチへの影響が少なく、果樹や果菜類の散布に最適。
- ハダニ類をはじめ、幅広い種類の害虫に優れた効果。





合成ピレスロイド系 殺虫・殺ダニ剤

マブリック® 水和剤20

登録番号:第16715号

有効成分:フルバリネート…20.0%

毒性:劇物

殺虫剤分類 3A

医薬用外劇物

上手な使い方

- 浸透移行性はないので、十分な散布液量で作物全体にかけむらのないよう散布してください。
 - 抵抗性発達回避のため、他系統の剤とのローテーション散布を行ってください。
 - 花き生育前期に2,000倍で散布し、生育後期の散布は避けてください。
- 使用にあたっては必ず小規模で試し散布をして、薬害の無いことを確かめてから広面積に散布してください。
- すもも、あんず、ネクタリンには薬害を生ずる恐れがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布してください。

適用害虫と使用方法

2024年7月現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネートを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	4000倍	収穫7日前まで	100～300 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
やまのいも	アブラムシ類、ヤマノイモコガ、ハスモンヨトウ	2000～4000倍	収穫14日前まで				
だいこん	アブラムシ類 コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アオムシ	2000倍	収穫7日前まで				
たまねぎ	ネギアザミウマ	2000～4000倍	収穫3日前まで				
にんにく	アブラムシ類、ネギコガ	2000倍	収穫前日まで		3回以内		3回以内
さやえんどう	ヒラズハナアザミウマ	4000倍	収穫前日まで	100～300 ℓ/10a	2回以内	2回以内	
きゅうり	アブラムシ類、オンシツコナジラミ		収穫21日前まで				
かぼちゃ	アブラムシ類	2000倍	収穫3日前まで		3回以内		3回以内
すいか	ハダニ類	4000倍	収穫前日まで				
メロン	アブラムシ類	2000倍	収穫前日まで				
なす	アブラムシ類、オンシツコナジラミ、ハダニ類	4000倍	収穫前日まで				
キャベツ	アブラムシ類 タマナギンウバ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アオムシ	2000～4000倍	収穫14日前まで	200～700 ℓ/10a		2回以内	
はくさい	アブラムシ類 タマナギンウバ、コナガ、ヨトウムシ、アオムシ	1000～2000倍	収穫21日前まで				
レタス	アブラムシ類	2000～4000倍	収穫21日前まで				
非結球レタス	アブラムシ類	4000倍	収穫7日前まで				
いちご	アブラムシ類	8000倍	収穫前日まで				
かんきつ (みかんを除く)	アブラムシ類、カメムシ類、チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ケムシ類	2000～4000倍	収穫45日前まで	200～700 ℓ/10a	2回以内	2回以内	
みかん	アブラムシ類、カメムシ類、チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ケムシ類	2000～4000倍	収穫21日前まで				
なし	アブラムシ類 カメムシ類、ニセナシサビダニ、ナシゲンバイ、ハダニ類、ハマキムシ類、 ナシチビガ、ナシホソガ、シンクイムシ類	2000倍	収穫30日前まで				
りんご	アブラムシ類、ナミハダニ、リンゴハダニ、ハマキムシ類、ギンモンハモグリガ、 キンモンボソガ、シンクイムシ類、ヒメシロモンドクガ、モモチョッキリゾウムシ	4000倍	収穫14日前まで				
びわ	アブラムシ類	2000～4000倍	収穫45日前まで				
おうとう	オウトウハマダラミバエ	2000倍	収穫21日前まで	200～700 ℓ/10a	2回以内	2回以内	
もも	アブラムシ類	2000倍	収穫30日前まで				
うめ	ハダニ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類 アブラムシ類、モモヒメヨコバイ、ケムシ類	4000倍	収穫前日まで				
かき	イラガ類、カメムシ類、チャノキイロアザミウマ	2000～4000倍	収穫前日まで				
キウイフルーツ	ミノガ類 カキノヘタムシガ	4000倍	収穫前日まで				
くり	クリシギゾウムシ	2000倍	収穫7日前まで	2～4ℓ/10a 2ℓ/10a	無人航空機 による散布		
カーネーション	クリシギゾウムシ	40倍					
きく	ハダニ類、ヨトウムシ	20倍		100～300 ℓ/10a	発生初期	散布	
宿根かすみそう	アブラムシ類	2000倍					
ストック	ハダニ類	2000～4000倍					
トルコギキョウ	コナガ	2000倍					
ばら	アザミウマ類	4000倍					
さくら	アブラムシ類	2000～4000倍		200～700 ℓ/10a			
つばき類	ハダニ類	2000倍					
茶	アメリカシロヒトリ	2000倍		200～400 ℓ/10a	摘採21日前まで		
	チャドクガ	4000倍					
	コムカンアブラムシ	2000～4000倍					
	ヨモギエダシヤク、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000倍					
	カンザワハダニ、チャノコカクモンハマキ	2000倍					
	チャノボソガ、ツマグロアオカスミカメ	2000倍					

注意事項

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- くりのクリタマバチには羽化脱出期、クリシギゾウムシには梨果前にそれぞれ使用してください。
- 夏季における果樹・茶のハダニ防除には残効が短い場合等効果にばれが生じることがあるので、ハダニ類を主体とした防除はさけてください。
- ある程度の夏季高温時の散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 長期に毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の森に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - 散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
 - 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - 散布薬液の飛散によって自動車やカラートランの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。

- 散布終了後は次の項目を守ってください。
 - ・使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - ・機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすようにしてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不透水性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- のど、鼻、皮膚等を刺激する場合、またはかゆみを生じることがあるので注意してください。
- 作業時に着用していた衣服などは他のものと分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 摘果などの作業の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 街路、公園などで使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 魚毒性等
 - 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼および海域などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
 - 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
 - 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
 - 使用残りの薬液が生じないように調製をおこない、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所にカギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。

安全使用上の注意



- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

本資料は2024年7月現在の知見に基づき作成しています。

自然に学び 自然を守る



クミアイ化学工業株式会社

本社:東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL03-3822-5036
ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>

詳しい使い方、登録内容とSDSはこちらから。



JAグループ

農 協

全 農

経済連

登録商標 第4702318号