

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 23479 号

登 録 年 月 日 平成29年 5月 28日

農 薬 の 種 類 ザンメット粉粒剤

農 薬 の 名 称 クミアイガスタード微粒剤

物 理 的 類白色微粒
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の 3, 5-ジメチルトラヒドロー-2H-1, 3, 5-チアジアゾン-2-チン 96. 5%
種 類 及 び 含 有 量

そ の 他 の 水分等 3. 5%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の ドイツ連邦共和国 ルートヴィヒスハーフェン D67056 カルホッッシュ通り
名 称 及 び 所 在 地 BASF SE ルートヴィヒスハーフェン工場
山口県熊毛郡平生町長浜531
三新化学工業(株)平生工場

小 分 製 造 場 兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場
広島県尾道市長者原2-160
クミアイ化学工業(株)尾道工場

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき、令和 7年 4月 23日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	トマトを含む農業の 総使用回数
キャベツ	苗立枯病(リゾクトニア菌)、株腐病、萎黄病、バクテリア性萎凋病、根こぶ病、ネオセンチュウ、一年生雑草		は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
非結球キャベツ	萎黄病、一年生雑草	20～30kg/10a	定植21日前まで			
はくさい	根こぶ病、尻腐病、根くびれ病、黄化病、ネオセンチュウ、一年生雑草		は種又は定植21日前まで			
だいごん	ネオセンチュウ	10～20kg/10a	は種21日前まで			
かぶ	バクテリア性黒点病、根こぶ病、萎黄病、一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
非結球あぶらな科葉菜類(非結球キャベツ、こまつな、非結球はくさい、なばな類、チンゲンサイ、みずなを除く)	根こぶ病	30kg/10a	は種14日前まで			
	一年生雑草	20～30kg/10a				
こまつな	萎黄病、根こぶ病、一年生雑草		は種10日前まで			
ブロッコリー、カリフラワー	デンサイストセンチュウ	30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
	根こぶ病、一年生雑草	20～30kg/10a				
		20kg/10a				
なばな類	根こぶ病、一年生雑草	20kg/10a	は種又は定植21日前まで			
チンゲンサイ		30kg/10a				
非結球はくさい	萎黄病、根こぶ病、一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植14日前まで			
みずな	立枯病(ピシウム菌)、根こぶ病、一年生雑草	30kg/10a	は種12日前まで			
はつかだいごん	一年生雑草	20kg/10a	は種35日前まで			
きゅうり	苗立枯病(ピシウム菌)、苗立枯病(リゾクトニア菌)	200～400g/m ²	は種又は定植21日前まで		土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
	つる割病、半身萎凋病、白絹病、一年生雑草					
かぼちゃ	苗立枯病(リゾクトニア菌)、フザリウム立枯病、一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	
メロン	黒点根腐病、つる割病、半身萎凋病、黒変根腐症、白絹病、一年生雑草				土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
	紅色根腐病	30kg/10a				
すいか	苗立枯病(リゾクトニア菌)	200～400g/m ²			土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
	つる割病、白絹病、一年生雑草				本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	
にがうり	つる割病、ネオセンチュウ、一年生雑草	20～30kg/10a				
トマト、ミニトマト	苗立枯病(リゾクトニア菌)	200～300g/m ²			土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
	萎凋病、褐色根腐病、白絹病、根腐萎凋病、半身萎凋病、ネオセンチュウ、一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	
	紅色根腐病	30kg/10a				

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	タゾメットを含む農薬の 総使用回数			
トマト、ミニトマト	青枯病	30～60kg/10a	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回			
なす		30kg/10a							
	苗立枯病(リゾクトニア菌)、半身萎凋病、白絹病、ネコブセンチュウ、一年生雑草	20～30kg/10a							
ピーマン	苗立枯病(リゾクトニア菌)、半身萎凋病、萎凋病、青枯病、白絹病、一年生雑草	30kg/10a							
ばれいしょ	そうか病、粉状そうか病、黒あざ病、萎凋病、一年生雑草	20～30kg/10a	植付21日前まで						
とうがらし類	苗立枯病(リゾクトニア菌)、萎凋病、疫病、青枯病、一年生雑草	30kg/10a	定植21日前まで						
ねぎ	黒腐菌核病	30～60kg/10a	は種又は定植14日前まで						
	紅色根腐病、ネバハタケリハエ	30kg/10a							
	苗立枯病(リゾクトニア菌)、白絹病、小菌核腐敗病、萎凋病、根腐萎凋病、ネコブセンチュウ、一年生雑草	20～30kg/10a							
わけぎ	黒腐菌核病	30kg/10a	は種又は定植21日前まで						
	苗立枯病(リゾクトニア菌)、一年生雑草	20～30kg/10a							
たまねぎ	黒腐菌核病	30～60kg/10a							
	紅色根腐病	30kg/10a							
	苗立枯病	20～40kg/10a							
	乾腐病、白絹病、ネコブセンチュウ、一年生雑草	20～30kg/10a							
	黒穂病、一年生雑草								
	べと病	20kg/10a							
	一年生雑草	10～20kg/10a							
葉たまねぎ(苗床)			は種14日前まで		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。				
にんにく	黒腐菌核病、紅色根腐病、白絹病、イモガサセンチュウ、一年生雑草		植付28日前まで						
らっきょう	黒腐菌核病、根腐病、乾腐病、ネコブセンチュウ、一年生雑草	30kg/10a	植付21日前まで						
にら	黒腐菌核病、乾腐病、紅色根腐病、白絹病		30～60kg/10a						
	一年生雑草								
にんじん	萎凋病、根腐病、しみ腐病、乾腐病、白絹病、ネコブセンチュウ、一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで						
パセリ	苗立枯病(リゾクトニア菌)、疫病、萎凋病、一年生雑草	30kg/10a	は種10日前まで						
セリ	萎黄病、一年生雑草								
あしたば	苗立枯病(リゾクトニア菌)、一年生雑草								
しゅんぎく	萎凋病、一年生雑草	20kg/10a	は種21日前まで						
ごぼう、葉ごぼう	萎凋病、黒あざ病、一年生雑草	20～30kg/10a	は種28日前まで						

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダブ対を含む農薬の総使用回数
適用雑草名						
もりあざみ	黒あざ病、半生萎凋病、一年生雑草	30kg/10a	は種21日前まで			
すそ枯病、白絹病、一年生雑草	20～30kg/10a					
黒根病、コバールト病、初サレチヤ	30kg/10a		は種又は定植14日前まで			
すそ枯病、根腐病、白絹病、一年生雑草	20～30kg/10a					
黒根病、コバールト病	30kg/10a					
萎凋病、半生萎凋病、白絹病、セチヤ類(ハサレチヤを除く)、一年生雑草	20～30kg/10a		は種又は定植21日前まで			
青枯病	30kg/10a					
半生萎凋病、白絹病、一年生雑草						
立枯病、一年生雑草	20kg/10a		は種21日前まで			
白絹病、一年生雑草			は種又は定植21日前まで			
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)	30kg/10a		は種21日前まで			
苗立枯病(リフト菌)、茎腐病、一年生雑草	20～30kg/10a		は種又は定植21日前まで			
えだまめ	30kg/10a		は種21日前又は定植45日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
未成熟そらまめ	30kg/10a		は種21日前又は定植45日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
さやえんどう、実えんどう	20～30kg/10a		は種又は定植21日前まで			
紫紋羽病、つる割病、白絹病、初サレチヤ、一年生雑草	30kg/10a					
基腐病	20～30kg/10a		植付21日前まで			
白絹病、乾腐病	20～30kg/10a					
根腐病、一年生雑草	20～30kg/10a					
乾腐病、初サレチヤ、一年生雑草	30kg/10a					
根茎腐敗病	30～60kg/10a					
一年生雑草	20～30kg/10a		定植21日前まで			
根茎腐敗病	30kg/10a					
一年生雑草	20～30kg/10a					
立枯症、一年生雑草	30kg/10a		定植42日前まで			
萎黄病、萎凋病、炭疽病、芽枯病、一年生雑草	20～30kg/10a		仮植又は定植21日前まで			
青枯病、疫病	30kg/10a					
立枯病、萎凋病、株腐病、根腐病、ハサレチヤ、コバールト病、一年生雑草	20～30kg/10a		は種10日前まで			

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメトを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	わいどナガナ、ナガナ	10kg/10a	は種10日前まで		本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。	
でんさい	叢根病、苗立枯病	200～400g/m ²	秋期(翌春は種)			
やまのいも、やまのいも(わが)	根腐病、褐色腐敗病、一年生雑草	20～30kg/10a	植付21日前まで		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	
つるむらさき	ネブセンチュウ、一年生雑草		定植21日前まで			
モペヤ		30kg/10a	定植30日前まで			
しそ	青枯病、一年生雑草		は種又は定植14日前まで			
チャービル	一年生雑草	20kg/10a	は種42日前まで			
なし	白紋羽病	100g/m ²			被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。	
ぶどう		50～100g/m ²	夏期～秋期			
りんご	紫紋羽病、白紋羽病					
ササバ	一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植前			
しゃくやく(薬用)	根黒斑病	30～40kg/10a	植付前			
薬用ごぼう	萎凋病、黒斑病、一年生雑草		は種又は定植前			
花き類・観葉植物	苗立枯病(リキア菌)、株腐病、球根腐敗病、首腐病、半身萎凋病、萎凋病、萎黄病、白絹病、立枯病、根頭がんしゅ病、ネブセンチュウ	20～30kg/10a		1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
	青枯病	30kg/10a	は種又は植付前			
	一年生雑草	20～60kg/10a				
カーネーション	萎凋細菌病					
きく	センチュウ類(ネブセンチュウを除く)	20～30kg/10a				
ストック	苗腐病					
	萎凋病	30～40kg/10a	植付前			
ぼたん、しゃくやく	根黒斑病		植付前			
グリンパ	紅色根腐病					
スイビー	腰折病					
さくらそう	軟腐病					
トウキキダマ	根腐病	20～30kg/10a	は種又は植付前			
アイスランドポピー	萎縮病					
せんりょう	立枯病、一年生雑草					
つつじ類	センチュウ類、一年生雑草					
樹木類(苗木)			植付前			
いぐさ	一年生雑草	30kg/10a	畑苗床での定植28日前まで(入水15日前まで)			
	角斑病、野火病、センチュウ類	10～20kg/10a	秋期(翌春植付)			
	立枯病、黒根病、疫病、一年生雑草	20～30kg/10a				
たばこ	疫病、センチュウ類	5～10kg/10a	春期(植付前)		本剤の所定量を畦面に散布して土壌と十分混和する。	

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ゲゾムトを含む農薬の 総使用回数
芝	一年生雑草	目土用土1m ³ 当り100～ 200g.	雑草発生前	1回	土壌に本剤の所定量 を加え十分混和する。	1回
		30kg/10a	は種又は定植21日 前まで		本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	
桑	紫紋羽病、白紋羽病	1株当り(4 m ²)400～600g	夏期～秋期		被害株跡地に本剤の 所定量を均一に散布 して土壌と十分混和 する。	

(別記1)

作物名	使用目的	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダブレットを含む農薬の総使用回数
樹木類	定植ほ場の南根腐病菌、ならたけ病菌、ならたけもどき病菌の密度低減	100g/m ²	定植前	1回	被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。	1回