

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2021年3月24日現在

| 作物名    | 適用害虫名                                | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数  | 使用方法 | シペルメトリンを含む農薬の総使用回数 |      |
|--------|--------------------------------------|------------|--------------|----------|----------|------|--------------------|------|
| 麦類     | アブラムシ類                               | 2000倍      | 60～150L/10a  | 収穫21日前まで | 3回以内     | 散布   | 3回以内               |      |
| とうもろこし | アブラムシ類<br>アワノメイガ                     | 1000～2000倍 | 100～300L/10a | 収穫7日前まで  |          |      |                    |      |
|        | アワヨトウ                                | 1000倍      |              |          |          |      |                    |      |
| ごぼう    | アブラムシ類                               | 2000倍      |              | 収穫14日前まで | 5回以内     |      |                    | 5回以内 |
| にんじん   | ヨトウムシ                                |            |              | 収穫7日前まで  | 2回以内     |      |                    | 2回以内 |
| たまねぎ   | アザミウマ類<br>ネギハモグリバエ<br>シロイモジヨトウ       |            |              | 48倍      | 2.4L/10a |      |                    |      |
|        | アザミウマ類<br>シロイモジヨトウ                   |            |              |          |          |      |                    |      |
| 葉にんにく  | ネギアザミウマ                              | 2000倍      | 100～300L/10a | 収穫前日まで   | 3回以内     | 散布   | 3回以内               |      |
| らっきょう  |                                      |            |              | 収穫3日前まで  | 5回以内     |      | 5回以内               |      |
| にら     | ネギアザミウマ<br>ハモグリバエ類<br>ネギコガ<br>ヨトウムシ類 |            |              | 収穫7日前まで  | 3回以内     |      | 3回以内               |      |
| にら(花茎) |                                      |            |              | 収穫前日まで   |          |      |                    |      |
| ねぎ     | アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>ネギハモグリバエ<br>ネギコガ | 1000倍      |              | 収穫7日前まで  | 5回以内     |      |                    | 5回以内 |
|        | シロイモジヨトウ                             |            |              |          |          |      |                    |      |
| わけぎ    | アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>ネギハモグリバエ<br>ネギコガ | 2000倍      |              | 収穫3日前まで  | 2回以内     |      | 2回以内               |      |

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2021年3月24日現在

| 作物名    | 適用害虫名  | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期    | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シペルメトリンを含む農薬の総使用回数 |      |
|--------|--|------------|--------------|---------|---------|------|--------------------|------|
| わけぎ    | シロイモジヨトウ                                       | 1000倍      | 100～300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内    | 散布   | 2回以内               |      |
| あずき    | アブラムシ類<br>ノメイガ類                                | 2000倍      |              | 0a      | 収穫7日前まで |      | 3回以内               | 3回以内 |
| いんげんまめ | アブラムシ類<br>インゲンテントウ                             |            |              |         |         |      |                    |      |
| だいず    | ジャガイモヒゲナガアブラムシ<br>カメムシ類<br>フタスジヒメハムシ<br>マメシクイガ |            |              |         |         |      |                    |      |
| えだまめ   | カメムシ類<br>フタスジヒメハムシ<br>マメシクイガ                   |            |              |         |         |      |                    |      |
| さやいんげん | アブラムシ類<br>インゲンテントウ                             |            |              |         |         |      |                    |      |
| 未成熟ささげ | アブラムシ類   |            |              |         |         |      |                    |      |
| きゅうり   | アブラムシ類<br>オンシツコナジラミ                            | 1000倍      |              | 収穫前日まで  | 5回以内    |      | 5回以内               |      |
|        | ミナキイロアザミウマ<br>トマトハモグリバエ                        |            |              |         |         |      |                    |      |
| かぼちゃ   | アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>ハスモンヨトウ                    | 2000倍      |              |         |         |      |                    |      |
| すいか    | アブラムシ類<br>ミナキイロアザミウマ                           | 1000～2000倍 |              |         |         |      |                    |      |
| メロン    | アブラムシ類   | 2000倍      |              |         |         |      |                    |      |

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2021年3月24日現在

| 作物名                            | 適用害虫名               | 希釈倍数  | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法  | シペルメトリンを含む農薬の総使用回数 |
|--------------------------------|---------------------|-------|--------------|----------|---------|-------|--------------------|
| トマト                            | ミナキイロアザミウマ          | 1000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで   | 5回以内    | 散布    | 5回以内               |
| なす                             | アブラムシ類<br>オンシツコナジラミ | 2000倍 |              |          |         |       |                    |
| なす                             | ミナキイロアザミウマ          | 1000倍 |              |          |         |       |                    |
| ピーマン                           | アブラムシ類              | 2000倍 |              | 収穫3日前まで  | 2回以内    |       | 2回以内               |
| エンサイ                           | ハスモンヨトウ             |       |              |          |         |       |                    |
| 非結球あぶらな科葉菜類<br>(チンゲンサイ、ケールを除く) | アブラムシ類              |       |              | 収穫前日まで   | 2回以内    |       | 2回以内               |
| チンゲンサイ                         | アブラムシ類<br>アオムシ      |       |              |          |         |       |                    |
| レタス                            | アブラムシ類              |       |              | 収穫7日前まで  | 5回以内    |       | 5回以内               |
| 非結球レタス                         |                     |       |              |          | 2回以内    |       | 2回以内               |
| しそ科葉菜類(しそ、ハバジルを除く)             |                     |       |              |          | 1回      |       | 1回                 |
| しそ                             | アブラムシ類<br>ヒシモンヨコバイ  | 2000倍 | 収穫3日前まで      | 2回以内     | 2回以内    |       |                    |
| ハバジル                           | アブラムシ類              |       |              |          |         |       |                    |
| ほうれんそう                         | アブラムシ類<br>ヨトウムシ     |       |              |          |         | 1000倍 | 収穫21日前まで           |
|                                | ミナキイロアザミウマ          |       |              |          |         |       |                    |
| アスパラガス                         | ヨトウムシ               | 2000倍 | 100～500L/10a | 収穫前日まで   | 3回以内    | 3回以内  |                    |
| 食用エキザカム<br>食用カーネーション           | アブラムシ類              | 1500倍 | 100～300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内    | 2回以内  |                    |

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2021年3月24日現在

| 作物名  | 適用害虫名  | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シペルメトリンを含む農薬の総使用回数 |
|--|--|------------|--------------|----------|---------|------|--------------------|
| 食用ぎく   | アブラムシ類<br>アザミウマ類<br>オオタバコガ<br>ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ                   | 1500倍      | 100～300L/10a | 収穫3日前まで  | 1回      | 散布   | 1回                 |
| 食用金魚草<br>食用せんにちこう<br>食用トニア<br>食用なでしこ<br>食用パソヅー<br>食用プリムラ | アブラムシ類   |            |              | 収穫14日前まで | 2回以内    |      | 2回以内               |
| いちご  | 2000倍  |            |              | 収穫前日まで   | 5回以内    |      | 5回以内               |
| しそ(花穂)   |  |            |              | 収穫3日前まで  | 2回以内    |      | 2回以内               |
| かんきつ   | アブラムシ類<br>カメムシ類<br>ケシキイ類<br>コアオハナムケガリ<br>チャノキイロアザミウマ<br>ミカンハモグリガ | 1000～2000倍 | 200～700L/10a | 収穫7日前まで  | 3回以内    |      | 3回以内               |
| キウイフルーツ  | カメムシ類<br>キクビノスサシバ<br>キウイヒメヨコバエ<br>キロマイコガ                         |            |              |          |         |      |                    |
| カーネーション  | アブラムシ類<br>ヨトウムシ類   | 2000倍      | 100～300L/10a | 発生初期     | 6回以内    |      | 6回以内               |
| きく   | アブラムシ類   |            | 200～700L/10a |          |         |      |                    |
| しきみ  |  |            |              |          |         |      |                    |

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2021年3月24日現在

| 作物名            | 適用害虫名                | 希釈倍数       | 使用液量               | 使用時期              | 本剤の使用回数 | 使用方法           | シペルメトリンを含む農薬の総使用回数 |
|----------------|----------------------|------------|--------------------|-------------------|---------|----------------|--------------------|
| さかき            | アブラムシ類<br>サカキゾチメヨコバイ | 2000倍      | 200～700L/10a       | 発生初期              | 6回以内    | 散布             | 6回以内               |
| 飼料用えんばく（は種用種子） | コクヌストモドキ             | 300倍       | 種子1kg当り<br>希釈液20ml | 貯蔵前               | 1回      | 種子吹き付け処理又は塗沫処理 | 1回                 |
| へぼかぼちゃ（種子）     | ヨトウムシ                | 2000倍      | 100～300L/10a       | 収穫7日前まで           | 4回以内    | 散布             | 4回以内               |
| たばこ            | アブラムシ類<br>オンシツコナジラミ  |            | 25～180L/10a        | 発生初期～収穫<br>10日前まで | 2回以内    |                | 2回以内               |
|                | タバコアオムシ<br>ヨトウムシ     | 2000～3000倍 |                    |                   |         |                |                    |