

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2023年1月11日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数	
麦類	アブラムシ類	2000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	
とうもろこし	アブラムシ類 アワノメイガ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで				
	アワヨトウ	1000倍						
ごぼう	アブラムシ類 ヒョウタンゾウムシ類	2000倍		収穫14日前まで	5回以内			5回以内
にんじん	ヨトウムシ			収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
たまねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリバエ シロイモジヨトウ			48倍	2.4L/10a		5回以内	無人航空機による散布
	アザミウマ類 シロイモジヨトウ							
葉にんにく	ネギアザミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
らっきょう				収穫3日前まで	5回以内			5回以内
にら	ネギアザミウマ ハモグリバエ類 ネギコガ ヨトウムシ類 クハバネキノコバエ類			収穫7日前まで	3回以内			3回以内
にら(花茎)				収穫前日まで				
ねぎ	アブラムシ類 アザミウマ類 ネギハモグリバエ ネギコガ	1000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内	
	シロイモジヨトウ							

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2023年1月11日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
わけぎ	アブラムシ類 アザミウマ類 ネギハモグリバエ ネギコガ	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
	シロイモジヨトウ	1000倍					
あずき	アブラムシ類 ノメイガ類	2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
いんげんまめ	アブラムシ類 インゲンテントウ						
だいず	ジャガイモリガナガアブラムシ カメムシ類 フタスジヒメハムシ マメシクイガ						
らっかせい	アブラムシ類						
えだまめ	カメムシ類 フタスジヒメハムシ マメシクイガ						
さやいんげん	アブラムシ類 インゲンテントウ						
未成熟ささげ	アブラムシ類						
きゅうり	アブラムシ類 オシツコナジラミ			収穫前日まで	5回以内		5回以内

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2023年1月11日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数				
きゅうり	ミナキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内				
かぼちゃ	アブラムシ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2000倍									
すいか	アブラムシ類 ミナキイロアザミウマ	1000～2000倍									
メロン	アブラムシ類	2000倍									
	ミナキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	1000倍									
トマト	アブラムシ類	2000倍									
なす	オンシツコナジラミ										
なす	ミナキイロアザミウマ	1000倍									
ピーマン	アブラムシ類	2000倍						収穫3日前まで	2回以内	2回以内	
エンサイ	ハスモンヨトウ							収穫前日まで			
非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)	アブラムシ類										
チンゲンサイ	アブラムシ類 アオムシ										
レタス	アブラムシ類							収穫7日前まで	5回以内		5回以内
非結球レタス									2回以内		2回以内
しそ科葉菜類(しそ、ハジルを除く)				1回	1回						

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2023年1月11日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
しそ	アブラムシ類 ヒシモンヨコバイ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
バジル	アブラムシ類	1000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内		2回以内
ほうれんそう	アブラムシ類 ヨトウムシ ミナキイロアザミウマ			収穫7日前まで	5回以内		5回以内
アスパラガス	ヨトウムシ	2000倍	100～500L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
食用エキザカム 食用カーネーション	アブラムシ類	1500倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
食用ぎく	アブラムシ類 アザミウマ類 オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ			収穫3日前まで	1回		1回
食用金魚草 食用せんにちこう 食用トニア 食用なでしこ 食用パソグー 食用プリムラ	アブラムシ類			収穫14日前まで	2回以内	2回以内	
いちご				2000倍	収穫前日まで	5回以内	5回以内
しそ(花穂)				収穫3日前まで	2回以内	2回以内	
かんきつ	アブラムシ類 カメムシ類 ケシキイ類 コアオハムクグリ チャノキイロアザミウマ ミカンハダガリガ	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2023年1月11日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 カメムシ類 ケシキイ類 コアオハナムグリ チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
キウイフルーツ	カメムシ類 キクヒスカシハ キウヒメヨコバエ キロマイカガ						
カーネーション	アブラムシ類 ヨトウムシ類	2000倍	100～300L/10a	発生初期	6回以内		6回以内
きく	アブラムシ類						
しきみ			200～700L/10a				
さかき	アブラムシ類 サカキアザミヨコバエ						
飼料用えんばく（は種用種子）	コクヌストムキ	300倍	種子1kg当り 希釈液20ml	貯蔵前	1回	種子吹き付け処理又は塗沫処理	1回
えごま（種子）	ウリハムシトムキ	2000倍	100～300L/10a	収穫35日前まで	2回以内	散布	2回以内
べぼかぼちゃ（種子）	ヨトウムシ			収穫7日前まで	4回以内		4回以内
たばこ	アブラムシ類 オシツコナヅラミ		25～180L/10a	発生初期～収穫 10日前まで	2回以内		2回以内

# アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2023年1月11日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ	2000～3000倍	25～180L/10a	発生初期～収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内