アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2026年5月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
麦類	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	2000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
とうもろこし	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで			
	ｱﾜﾖﾄｳ	1000倍					
ごぼう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ類	2000倍		収穫14日前まで	5回以内		5回以内
にんじん	ﾖﾄｳﾑｼ			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
たまねぎ	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ				5回以内		5回以内
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	48倍	2.4～3.2L/10a			無人航空機による散布	
葉にんにく	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
らっきょう				収穫3日前まで	5回以内		5回以内
にら	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾈｷﾞｺｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ類 ｸﾛﾊﾞﾈｷﾉｺﾊﾞｴ類			収穫7日前まで	3回以内		3回以内
にら(花茎)				収穫前日まで			
ねぎ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾈｷﾞｺｶﾞ	1000～2000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
	ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	1000倍					

適用拡大登録月日：2026年05月13日

アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2026年5月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
わけぎ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ﾈｷﾞｺｶﾞ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	1000倍					
あずき	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾉﾒｲｶﾞ類	2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
いんげんまめ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｲﾝｹﾞﾝﾃﾝﾄｳ						
だいず	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾌﾀｽｼﾞﾋﾒﾊﾑｼ ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ						
らっかせい	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類			収穫前日まで			
えだまめ	ｶﾒﾑｼ類 ﾌﾀｽｼﾞﾋﾒﾊﾑｼ ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ			収穫7日前まで			
さやいんげん	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｲﾝｹﾞﾝﾃﾝﾄｳ						
未成熟ささげ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類			収穫前日まで			
きゅうり	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	1000～2000倍			5回以内		5回以内
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類	1000倍					

適用拡大登録月日：2026年05月13日

アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2026年5月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
かぼちゃ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	2000倍					
すいか	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000～2000倍					
ﾒﾛﾝ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類						
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類	1000倍					
ﾄﾏﾄ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	2000倍					
なす		1000～2000倍					
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000倍					
ﾋﾟｰﾏﾝ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	2000倍					
ｴﾝｻｲ	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ			収穫3日前まで	2回以内		2回以内
非結球あぶらな科葉菜類(ﾁﾝｹﾞﾝｻｲを除く)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類			収穫前日まで			
ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｱｵﾑｼ						
ﾚﾀｽ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類			収穫7日前まで	5回以内		5回以内
非結球ﾚﾀｽ					2回以内		2回以内
しそ科葉菜類(しそ、ﾊﾞｼﾞﾙを除く)					1回		1回
しそ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾋｼﾓﾝﾖｺﾊﾞｲ						

適用拡大登録月日：2026年05月13日

アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2026年5月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
しそ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾋｼﾓﾝﾖｺﾊﾞｲ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
ﾊﾞｼﾞﾙ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類			収穫3日前まで	2回以内		2回以内
ほうれんそう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾊｸｻｲﾀﾞﾆ ﾖﾄｳﾑｼ	1000～2000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000倍					
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ	ﾖﾄｳﾑｼ	2000倍	100～500L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
食用ｴｷｻﾞｶﾑ 食用ｶｰﾈｰｼｮﾝ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1500倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
食用ぎく	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ			収穫3日前まで	1回		1回
食用金魚草 食用せんにちこう 食用ﾄﾚﾆｱ 食用なでしこ 食用ﾊﾟﾝｼﾞｰ 食用ﾌﾟﾘﾑﾗ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類			収穫14日前まで	2回以内		2回以内
しそ(花穂)		2000倍		収穫3日前まで			
いちご				収穫前日まで	5回以内		5回以内
かんきつ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ｹｼｷｽｲ類 ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内

適用拡大登録月日：2026年05月13日

アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2026年5月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ｹｼｷｽｲ類 ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
ｷｳｲﾌﾙｰﾂ	ｶﾒﾑｼ類 ｷｸﾋﾞｽｶｼﾊﾞ ｷｳｲﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ ｷｲﾛﾏｲｺｶﾞ						
ｶｰﾈｰｼｮﾝ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾖﾄｳﾑｼ類	2000倍	100～300L/10a	発生初期	6回以内		6回以内
きく	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類						
しきみ			200～700L/10a				
さかき	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｻｶｷﾌﾞﾁﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ						
飼料用えんばく（は種用種子）	ｺｸﾇｽﾄﾓﾄﾞｷ	300倍	種子1kg当り希釈液20mL	貯蔵前	1回	種子吹き付け処理又は塗沫処理	1回
えごま（種子）	ｳﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ	2000倍	100～300L/10a	収穫35日前まで	2回以内	散布	2回以内
ぺぽかぼちゃ（種子）	ﾖﾄｳﾑｼ			収穫7日前まで	4回以内		4回以内
たばこ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ		25～180L/10a	発生初期～収穫10日前まで	2回以内		2回以内

適用拡大登録月日：2026年05月13日

アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

適用害虫と使用方法

2026年5月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
たばこ	ﾀﾊﾞｺｱｵﾑｼ ﾖﾄｳﾑｼ	2000～3000倍	25～180L/10a	発生初期～収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内

適用拡大登録月日：2026年05月13日