

# テクリードCフロアブル（イプロナゾール・銅水和剤）

適用病害と使用方法

2005年11月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロナゾールを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 褐条病 ごま葉枯病 苗立枯細菌病 苗立枯病（リゾーパス菌） 苗立枯病（トリコデルマ菌） ばか苗病 もみ枯細菌病	20倍	浸種前	1回	10分間種子浸漬	1回	-
		200倍			24時間種子浸漬		
		7.5倍（使用量は乾燥種籾1kg当り希釈液30mL）			種子吹き付け処理（種子消毒機使用）又は種子塗沫処理		
		4倍、使用量は乾燥種籾1kg当り希釈液20mL					
	原液（使用量は乾燥種籾1kg当り原液5mL）		種子塗沫処理				

# テクリードCフロアブル（イプロナゾール・銅水和剤）

適用病害と使用方法

2005年11月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロナゾールを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
稲	<small>                     ① すす病                      ② ぬめ病                      ③ ぬめ病（葉）                      ④ ぬめ病（穂）                      ⑤ ぬめ病（茎）                      ⑥ ぬめ病（根）                 </small>	原液（使用量は乾燥種 粃1kg当り原液5ml）	浸種前	1回	種子塗沫処理	1回	-