

アグロスリン水和剤（シペルメトリン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
かんしょ	アブラムシ類 ナカヅロシバ ハスモンヨトウ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
	コナジラミ類 エビガラスズメ ネキアザミウマ ハムシ類 イモガ ヨトウムシ	1000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類	1000～2000倍			4回以内		4回以内
だいこん	アブラムシ類 コナガ ヨトウムシ アオムシ				5回以内		5回以内
てんさい	ヨトウムシ			収穫14日前まで	4回以内		4回以内
はつかだいこん	アブラムシ類 コナガ ヨトウムシ アオムシ			収穫3日前まで	1回		1回
たまねぎ	アザミウマ類	1000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日まで			
すいか メロン	アブラムシ類	1000～2000倍					
トマト	アブラムシ類						
ミニトマト	オンシツコナジラミ	2000倍			2回以内		2回以内
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ミナミキイロアザミウマ	1000倍			5回以内		5回以内

適用拡大登録月日：2024年06月26日

アグロスリン水和剤（シペルメトリン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
なす	アブラムシ類 オンツコナジラミ ミナキイロアザミウマ	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
ピーマン	アブラムシ類 タバコガ	2000倍					
かんしょ(茎葉)	アブラムシ類 ナカジロシタハ ハスモンヨトウ	1000～2000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
	コナジラミ類 エビガラスズメ ネキアザミウマ ハムシ類 イモコガ ヨトウムシ	1000倍					
なばな類	アブラムシ類				3回以内		3回以内
キャベツ	アブラムシ類 タマキシンクワバ コナガ ヨトウムシ アオムシ	1000～2000倍			5回以内		5回以内
	アザミウマ類	1000倍					
はくさい	アブラムシ類 コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ	1000～2000倍		収穫前日まで			
	アザミウマ類	1000倍					
レタス	アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで			
非結球レタス					2回以内		2回以内

適用拡大登録月日：2024年06月26日

アグロスリン水和剤（シペルメトリン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
みょうが(花穂)	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	5回以内
	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	1000倍					
みょうが(茎葉)	アブラムシ類	1000～2000倍		みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで		散布	
	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	1000倍					
かんきつ	アブラムシ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ ミカンハエ成虫 ヒメエカブリハ アザビコノハ	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内

適用拡大登録月日：2024年06月26日

アグロスリン水和剤（シペルメトリン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ ミカンハエ成虫 ヒメエグリハ アケビコノハ	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
なし	アブラムシ類 カメムシ類 ハマキムシ類 シンクイムシ類 アブラゼミ ナシチビガ	1000～2000倍 1000倍		収穫前日まで			
りんご	アブラムシ類 キンモンハモグリガ キンモンホリガ シンクイムシ類	1000～2000倍			2回以内		2回以内
	ハマキムシ類 ヒメシロモントクガ モモチヨッキリゾウムシ	1000倍					
おうとう	クビアカツヤカミキリ カメムシ類 ショウジョウハエ類 オウトウハマダラミハエ			収穫3日前まで			

 適用拡大登録月日：2024年06月26日

アグロスリン水和剤（シペルメトリン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
もも	アブラムシ類 カメムシ類 モモハモグリガ アカエグリハ オオエグリハ ヒメエグリハ アケビコノハ シンクイムシ類	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
	クビアカツヤカミキリ	1000倍					
ネクターリン	アブラムシ類 カメムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類	1000～2000倍			2回以内		2回以内
	クビアカツヤカミキリ	1000倍					
うめ	アブラムシ類 モモヒメヨコバイ	2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
すもも	クビアカツヤカミキリ カメムシ類 シンクイムシ類	1000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
ぶどう	コガネムシ類 フタテンヒメヨコバイ	1000～2000倍		収穫21日前まで	5回以内		5回以内
	チャノキイロアザミウマ	1000～3000倍					

適用拡大登録月日：2024年06月26日

アグロスリン水和剤（シペルメトリン水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
かき	カメシ類 アザミウマ類 カキハタムシ	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	くり	クリシゴウムシ クリタマバチ		1000～3000倍 1000倍	収穫7日前まで		
くるみ	アメリカシロヒトリ	1000～2000倍	200～400L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000倍		成虫発生初期	6回以内		6回以内
茶	ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000倍	200～400L/10a	摘採14日前まで	1回	散布	1回
	チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホソカ	1000倍					

適用拡大登録月日：2024年06月26日