

# トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2019年8月5日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
稲	-	イナゴ類 ウンカ類 イネトノオイムシ ツマクノヨコバイ	1000～2000倍	60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
		ウンカ類	300～600倍	25L/10a				
		カメムシ類 イネミスズウムシ	2000倍	60～150L/10a				
		カメムシ類 イネミスズウムシ イネトノオイムシ ツマクノヨコバイ	600倍	25L/10a				
		イネミスズウムシ イネトノオイムシ ツマクノヨコバイ	300倍					
		コブノメイガ	1000倍	60～150L/10a				
小麦	-	アブラムシ類 ヒメトビウンカ	2000倍			2回以内	2回以内	
とうもろこし		アワノメイガ アワヨトウ	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	4回以内	
あわ		アワヨトウ			収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
きび		アカスズカスミカメ						
水田作物、畑作物（休耕田）	ヨシ、ササ、ススキ、セトウグサ等 の多年生雑草が 優占している 休耕田	カメムシ類	2000倍	60～150L/10a	-			

# トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2019年8月5日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数			
キャベツ	-	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300L/ 10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内			
だいこん		コナガ			収穫21日前まで						
はくさい		ヨトウムシ			収穫7日前まで						
ブロッコリー		アオムシ			収穫前日まで						
かぼちゃ		コナジラミ類	1000倍		1000倍						
		ウリハムシ									
きゅうり		アブラムシ類									
		コナジラミ類									
すいか		アブラムシ類									
		コナジラミ類									
		ヨトウムシ									
		ハスモンヨトウ									
にがうり		アブラムシ類									
		カメムシ類									
	コナジラミ類										
	ウリノメイガ										
	ヨトウムシ類										
メロン	アブラムシ類	1000～2000倍	1000倍			4回以内		4回以内			
	コナジラミ類										
トマト	コナジラミ類										
ピーマン	アブラムシ類	1000～2000倍	1000倍			2回以内		2回以内			
なす	アブラムシ類										
	コナジラミ類	1000～2000倍	1000倍			3回以内		3回以内			
	アブラムシ類										

# トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2019年8月5日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
えだまめ	-	ツメクサガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジ マダラメイガ ウコンノメイガ マメシクイガ ダ イヌ サヤタマバエ	1000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
		ハスモンヨトウ	1000～2000倍					
さやいんげん	-	ワタアブラムシ マメノメイガ ウラナミシジミ	1000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
さやえんどう 実えんどう		ウラナミシジミ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ						
未成熟ささげ うど		アブラムシ類						
okra		アブラムシ類 カメムシ類						
しょうが		ハスモンヨトウ						
食用ぎく	アブラムシ類	2000倍	2000倍	100～300L/ 10a	収穫3日前まで	2回以内	2回以内	
ふき	コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ	1000倍	1000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
					根株養成期（ 但し、収穫45 日前まで）			
					収穫前日まで	3回以内		3回以内
					収穫7日前まで			

# トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2019年8月5日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
モロイヤ	-	アザミウマ類	1000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
ねぎ		シロイモジヨトウ			収穫21日前まで	2回以内		2回以内
レタス		アブラムシ類			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
さといも(葉柄)		ハスモンヨトウ	収穫7日前まで					
あしたば		アブラムシ類	2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
やまのいも(むかご)		アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ	1000倍		収穫7日前まで			
葉しょうが		ハスモンヨトウ			収穫7日前まで			
ほうきぎ		ホウキグツツミナガ			収穫30日前まで	2回以内		2回以内
せり		水田	アブラムシ類		100～150L/ 10a			
せり(水耕栽培)		ガラス室等の施設						
みつば	-		100～300L/ 10a	収穫21日前まで (但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで)	3回以内	3回以内		
せんきゅう		ウリハムシトドキ		収穫14日前まで				
採種用とうき		キアゲハ		幼虫発生期	6回以内	6回以内		
かんきつ		ケシキイ類 コアオナムグリ		200～700L/ 10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
		チャノキイロアザミウマ			2000倍			
		ミカンハモグリガ			1000～2000倍			
マンゴー		チャノキイロアザミウマ		1000倍	収穫7日前まで			

# トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2019年8月5日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	
カーネーション きく	-	アブラムシ類	2000倍	100～300L/ 10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
宿根かすみそう		ヨトウムシ							-
		シロイハナユシ	1000倍						
トルコギキョウ		ハスモンヨトウ							
ゆり		アブラムシ類	2000倍						
りんどう		ヒラスハナアザミウマ							
樹木類(つつじ類、ホ °インセチア、ソテツを除く)		オビカレハ			100～700L/ 10a	幼虫発生期			
		シャクトリムシ類 ケムシ類	4000倍						
ホ°インセチア		オビカレハ	2000倍						
		コナジラミ類	1000倍			-			
		シャクトリムシ類 ケムシ類	4000倍			幼虫発生期			
ソテツ		オビカレハ	2000倍						
		シャクトリムシ類 ケムシ類	4000倍						
		クロマダラソテツジミ	2000～4000倍						
つつじ類		オビカレハ	2000倍						
		シャクトリムシ類 ケムシ類	4000倍						
		ツツジゲンバイ	2000倍			-			

# トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2019年8月5日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く)	-	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジマダラメイガ アスキノメイガ マメシクイガ ウラナミシジミ ハスモンヨトウ ダイズサヤマバエ	1000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
あずき		アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ ノメイガ類 シロイチモジマダラメイガ マメシクイガ ウラナミシジミ ハスモンヨトウ ダイズサヤマバエ						

# トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2019年8月5日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	
だいず	-	アブラムシ類 ツメクサガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジマダラメイガ ウコンノメイガ アズキノメイガ マメシクイガ ウラナミシジミ ハスモンヨトウ ダイズサヤタマハエ	1000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
かんしょ		アブラムシ類 ナカジロシタバ ハスモンヨトウ			収穫7日前まで				3回以内
さといも		ハスモンヨトウ			収穫14日前まで				
ばれいしょ		アブラムシ類			収穫7日前まで				
やまのいも		アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ			収穫14日前まで				
みずいも		水田			オキナワケゴトトギ				
茶	-	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバエ チャノホリガ	2000倍	200～400L/ 10a	摘採21日前まで	2回以内	2回以内		

# トレボン乳剤（エトフェンプロックス乳剤）

適用害虫と使用方法

2019年8月5日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
てんさい	-	ヨトウムシ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
たばこ		アブラムシ類		25～180L/10a	-	2回以内		2回以内
		タバコガ ヨトウムシ	2000倍					