

# トレボン粒剤（エトフェンプロックス粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年4月21日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	
稲	イコ <sup>ゴ</sup> 類 ウカ <sup>カ</sup> 類 イネ <sup>メ</sup> ゾウ <sup>ムシ</sup> イネ <sup>メ</sup> ゾウ <sup>ムシ</sup> イネ <sup>メ</sup> ロオ <sup>ムシ</sup> イネ <sup>メ</sup> ハモ <sup>グ</sup> リ <sup>ハ</sup> エ ツマ <sup>グ</sup> ロヨ <sup>コ</sup> ハ <sup>イ</sup>	2～3kg/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	ニカ <sup>メ</sup> イ <sup>チュウ</sup> 第1世代	3kg/10a					
畑わさび	ワサ <sup>ビ</sup> ル <sup>リ</sup> イ <sup>ロ</sup> サル <sup>ゾウ</sup> ム <sup>シ</sup> ナト <sup>ビ</sup> ハ <sup>ムシ</sup>	3kg/10a	収穫14日前まで	1回	植溝土壌混和	2回以内（但し、 植付時の土壌混和は1回以内、 散布は1回以内）	
	ナト <sup>ビ</sup> ハ <sup>ムシ</sup>		植付時				
わさび			畑育苗期				散布
			畑育苗期（但し、 植付時）				植溝土壌混和
れんこん	イネ <sup>ク</sup> イ <sup>ムシ</sup>		収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
さとうきび	ハリ <sup>ガ</sup> ネ <sup>ムシ</sup> 類	9kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	1回	
いぐさ	イ <sup>グ</sup> サ <sup>ムシ</sup> ガ <sup>ク</sup>	2kg/10a	-	3回以内	散布	3回以内	