

クサカリテイオー 1 キロ粒剤 5 1 (ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン粒剤)

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オトギリソウ クダシラン コウキヤガラ(関東・東山・東海、九州) セリ(北陸を除く) ヒルムシロ(関東・東山・東海、九州) ホタルイ マツバ ミズガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	移植直後～ ルビ1.5葉期(但し、 移植後30日まで)	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内
		移植時				田植同時散布機で施用				

クサカリテイオー 1 キロ粒剤 5 1 (ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン粒剤)

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	<small> 1. 雑草名 2. 適用時期 3. 適用土壌 4. 使用量 5. 本剤の使用回数 6. 使用方法 7. 適用地帯 8. ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 9. ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 10. ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 </small>	移植時	砂壤土～埴土	1kg/10a	1回	田植同時散布機で施用	<small> 全域（北海道、東北を除く）の普通期及び早期栽培地帯 </small>	2回以内	2回以内	2回以内