

グラスショット液剤（ビスピリバックナトリウム塩液剤）

適用雑草と使用方法

2014年4月23日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ビスピリバックナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	ホトケ	生育期（但し、収穫前日まで）	300～500ml/10a	50～100L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
林木	林地	クサ	生育初期（5月～6月）	つる径：使用量（ml/株） 2.0cm以下：0.5、2.1～3.0cm：1.0、3.1～4.0cm：1.5、4.1～5.0cm：2.0、5.1cm以上：適宜増量	原液		つる注入処理	
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、運動場、宅地等							

グラスショット液剤（ビスピリバックナトリウム塩液剤）

適用雑草と使用方法

2014年4月23日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ビスピリバックナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、運動場、宅地等	クサ	生育期	500～1000m l/10a	100～200L/ 10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内

グラスショット液剤（ビスピリバックナトリウム塩液剤）

2014年4月23日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用目的	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ビスピリバックナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生雑草	草丈抑制による刈り取り軽減	雑草生育初期（草丈10cm）及び草刈り後10～20日の雑草再生期（但し、収穫前日まで）	300～500ml/10a	通常散布50～100L/10a、少量散布25L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、運動場、宅地等			雑草生育期又は刈取後（草丈30～50cm）	500～1000ml/10a	通常散布100～200L/10a、少量散布25～50L/10a		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	