

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数	
かんしょ	白絹病 つる割病 紫紋羽病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	植付21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回	
	基腐病	30kg/10a					
こんにゃく	乾腐病 白絹病	20～30kg/10a					
	根腐病 一年生雑草	20～60kg/10a					
さといも	乾腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a					
ばれいしょ	萎凋病 黒あざ病 そうか病 粉状そうか病 一年生雑草						
やまのいも	褐色腐敗病 根腐病 一年生雑草						
かぶ	萎黄病 根こぶ病 バネツリウム黒点病 一年生雑草						
ごぼう	萎凋病 黒あざ病 一年生雑草						は種28日前まで
しょうが	根茎腐敗病	30～60kg/10a					定植21日前まで
	一年生雑草	20～30kg/10a					
葉しょうが	根茎腐敗病	30kg/10a					

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
葉しょうが	一年生雑草	20～30kg/10a	定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
だいこん	萎黄病 根こぶ病 バクテリア黒点病 一年生雑草		は種21日前まで			
	ネグサレセンチュウ	10～20kg/10a				
てんさい	叢根病 苗立枯病	200～400g/立方メートル	秋期（翌春は種）			
にんじん	萎凋病 乾腐病 白絹病 根腐病 しみ腐病 ネグサレセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
はつかだいこん	一年生雑草	20kg/10a	は種35日前まで			
もりあざみ	黒あざ病 半身萎凋病 一年生雑草	30kg/10a	は種21日前まで			
たまねぎ	乾腐病 白絹病 ネグサレセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
	黒腐菌核病	30～60kg/10a				
	黒穂病 一年生雑草	20～30kg/10a	秋期（翌春は種）			
	紅色根腐病	30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
	苗立枯病	20～40kg/10a				

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	べと病	20kg/10a	は種14日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する	1回
たまねぎ 葉たまねぎ(苗床)	一年生雑草	10～20kg/10a				
にんにく	紅色根腐病 白絹病 イモガサセンチュウ 一年生雑草	30kg/10a	植付28日前まで		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	
らっきょう	乾腐病 根腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草		植付21日前まで			
にら	乾腐病 紅色根腐病 白絹病 一年生雑草		30～60kg/10a			
ねぎ	萎凋病 白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 根腐萎凋病 小菌核腐敗病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植14日前まで			
	黒腐菌核病	30～60kg/10a				
	紅色根腐病 袷ハモグリバエ	30kg/10a				

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
わけぎ	苗立枯病（リゾクトニア菌） 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日 前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
豆類(未成熟、ただし、え だまめ、実えんどう、さや えんどう、さやいんげん、 未成熟そらまめを除く)	茎腐病 苗立枯病（リゾクトニア菌 ） 一年生雑草	30kg/10a	は種21日前まで			
えだまめ	白絹病 苗立枯病（リゾクトニア菌） 葉腐病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日 前まで			
	ダイズシストセンチュウ	30kg/10a				
さやいんげん	白絹病 苗立枯病（リゾクトニア菌） 葉腐病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種21日前まで			
さやえんどう 実えんどう	茎腐病 苗立枯病（リゾクトニア菌） 一年生雑草		は種又は定植21日 前まで			
未成熟そらまめ	茎腐病 苗立枯病（リゾクトニア菌） えそザク病 一年生雑草	30kg/10a	は種21日前又は定 植45日前まで			
きゅうり	白絹病 つる割病 半身萎凋病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日 前まで			

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
きゅうり	苗立枯病（リゾクトニア菌） 苗立枯病（ピシウム菌）	200～400g/立方メートル	は種又は定植21日前まで	1回	土壌に本剤の所定量を加え十分混和する	1回
にがうり	つる割病 ネアヘンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	
かぼちゃ	苗立枯病（リゾクトニア菌） アザリウム立枯病 一年生雑草				土壌に本剤の所定量を加え十分混和する	
すいか	白絹病 つる割病 一年生雑草 苗立枯病（リゾクトニア菌）	200～400g/立方メートル			土壌に本剤の所定量を加え十分混和する	
メロン	紅色根腐病	30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	
	黒点根腐病 白絹病 つる割病 半身萎凋病 黒変根腐症 一年生雑草	20～30kg/10a			土壌に本剤の所定量を加え十分混和する	
	苗立枯病（リゾクトニア菌）	200～400g/立方メートル			土壌に本剤の所定量を加え十分混和する	

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
トマト	青枯病	30～60kg/10a	は種又は定植21日 前まで	1回	本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	1回
	萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a				
	紅色根腐病	30kg/10a				
	苗立枯病（リゾクトニア菌）	200～300g/立方 メートル				
ミニトマト	青枯病	30～60kg/10a			本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	
	萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a				
	紅色根腐病	30kg/10a				
	苗立枯病（リゾクトニア菌）	200～300g/立方 メートル				
なす	青枯病	30kg/10a			本剤の所定量を均 一に散布して土壌 と混和する	
	白絹病 苗立枯病（リゾクトニア菌） 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a				

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
ピーマン	青枯病 萎凋病 白絹病 苗立枯病（リゾクトニア菌） 半身萎凋病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
とうがらし類	青枯病 萎凋病 疫病 苗立枯病（リゾクトニア菌） 一年生雑草		定植21日前まで			
カリフラワー	根こぶ病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
	テンサイストセンチュウ	30kg/10a				
ブロッコリー	根こぶ病 一年生雑草	20～30kg/10a				
	テンサイストセンチュウ	30kg/10a				
つるむらさき	ネコセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	定植21日前まで			
モロヘイヤ		30kg/10a	定植30日前まで			
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、しろな、チンゲンサイ、ひろしまな、みずな、なばな類を除く)	根こぶ病		は種14日前まで			
	一年生雑草	20～30kg/10a				
こまつな	萎黄病 根こぶ病 一年生雑草		は種10日前まで			

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
チゲンサイ	根こぶ病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
非結球キャベツ	萎黄病 一年生雑草	20～30kg/10a	定植21日前まで			
みずな	立枯病（ピシウム菌） 根こぶ病 一年生雑草	30kg/10a	は種12日前まで			
なばな類	根こぶ病 一年生雑草	20kg/10a	は種又は定植21日前まで			
しろな	萎黄病 根こぶ病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種21日前まで			
ひろしまな	根こぶ病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植14日前まで			
キャベツ	萎黄病 株腐病 苗立枯病（リゾクトニア菌） 根こぶ病 バクテリア萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
はくさい	黄化病 根くびれ病 根こぶ病 尻腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草					

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
あしたば	苗立枯病（リゾクトニア菌） 一年生雑草	30kg/10a	は種10日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
セルリー	萎黄病 一年生雑草		は種又は定植21日前まで			
チャービル	一年生雑草	20kg/10a	は種42日前まで			
パセリ	萎凋病 疫病 苗立枯病（リゾクトニア菌） 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
みつば	立枯病 一年生雑草	20kg/10a	は種21日前まで			
レタス	白絹病 すそ枯病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種又は定植14日前まで			
	ネグサレセンチュウ	30kg/10a				
非結球レタス	白絹病 すそ枯病 根腐病 一年生雑草	20～30kg/10a				
しゅんぎく	萎凋病 一年生雑草	20kg/10a	は種21日前まで			
葉ごぼう	萎凋病 黒あざ病 一年生雑草	20～30kg/10a	は種28日前まで			
しそ	青枯病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植14日前まで			

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	萎凋病 株腐病 立枯病 根腐病 ホレンソウケガコナダニ 一年生雑草	20～30kg/10a	は種10日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
さといも(葉柄)	乾腐病 ホレンソウケガコナダニ 一年生雑草		植付21日前まで			
ふき	白絹病 半身萎凋病 一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日前まで			
食用ぎく	青枯病 萎凋病 白絹病 半身萎凋病 センチュウ類(ハガレンチュウを除く) 一年生雑草					
いちご	青枯病 疫病	30kg/10a	仮植又は定植21日前まで			
	萎黄病 萎凋病 炭疽病 芽枯病 一年生雑草	20～30kg/10a				
みょうが(花穂) みょうが(茎葉)	立枯症 一年生雑草	30kg/10a	定植42日前まで			
なし	白紋羽病	100g/m ²	夏期～秋期			
りんご	白紋羽病 紫紋羽病	50～100g/m ²				
ぶどう	白紋羽病					

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物	青枯病	30kg/10a	は種又は植付前	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
	萎黄病 萎凋病 株腐病 球根腐敗病 首腐病 根頭がんしゅ病 白絹病 立枯病 苗立枯病（リゾクトニア菌） 半身萎凋病 ネコフセンチュウ	20～30kg/10a				
アイスランドホップ	萎縮病	20～30kg/10a				
カーネーション	萎凋細菌病					
きく	センチュウ類（ハダレセンチュウを除く）					
グロリア	紅色根腐病					
さくらそう	軟腐病					
しゃくやく	根黒斑病	30～40kg/10a	植付前			
スイピー	腰折病	20～30kg/10a	は種又は植付前			
スターチス	萎凋細菌病					
ストック	萎凋病	30～40kg/10a				
	苗腐病	20～30kg/10a				
トウモロコシ パッション	根腐病	30～40kg/10a	植付前			
ぼたん	根黒斑病					

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

適用病害虫・雑草と使用方法

2021年2月24日現在

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
樹木類(苗木)	一年生雑草	20～30kg/10a	植付前	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	1回
せんりょう	立枯病 一年生雑草		は種又は植付前			
つつじ類	センチュウ類 一年生雑草					
芝	一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植21日前まで		土壌に本剤の所定量を加え十分混和する	
		目土用土1立方メートル当り100～200g	雑草発生前			
桑	白紋羽病 紫紋羽病	1株当り（4㎡） 400～600g	夏期～秋期		被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する	
たばこ	疫病 黒根病 立枯病 一年生雑草	20～30kg/10a	秋期（翌春植付）		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	
	疫病 センチュウ類	5～10kg/10a	春期（植付前）		本剤の所定量を畦面に散布して土壌と十分混和する	
	角斑病 野火病 センチュウ類	10～20kg/10a	秋期（翌春植付）		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	

ガスタード微粒剤（ダゾメット粉粒剤）

2021年2月24日現在

作物名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数	使用目的
樹木類	100g/m ²	定植前	1回	被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する	1回	定植ほ場の南根腐病菌の密度低減