

グリーンペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病 夏疫病	400～600倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	10回以内	散布	10回以内(但し、無人航空機散布は3回以内)
	疫病	100倍	25L/10a				
てんさい	褐斑病	400～600倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	5回以内		5回以内
		125倍	25L/10a				
にんじん	黒葉枯病	400～600倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
たまねぎ	黒斑病 灰色かび病 べと病 軟腐病			400倍	収穫3日前まで		5回以内
ねぎ	黒斑病 さび病 べと病	600倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
あずき	さび病	400倍		収穫30日前まで	3回以内		
だいず	紫斑病	400～600倍		収穫45日前まで			
	べと病	400倍					
きゅうり	褐斑病 黒星病 炭疽病	600倍	100～300L/10a	収穫前日まで			
	べと病	600～800倍					
かぼちゃ	疫病 べと病	600倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	2回以内		2回以内
すいか	褐色腐敗病	400～600倍		収穫7日前まで	7回以内		7回以内
	炭疽病 つる枯病						
メロン	つる枯病 べと病				5回以内		5回以内


適用拡大登録月日：2024年10月30日

グリーンペンコゼブ水和剤（マンゼブ水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
メロン	つる枯病 べと病	400～600倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
キャベツ	べと病	600倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
はくさい	黒斑病 白斑病 べと病				1回		1回
アスパラガス(露地栽培)	茎枯病 斑点病	500倍	収穫終了後(但し、秋期まで)	6回以内	6回以内		

 適用拡大登録月日：2024年10月30日